



**THÀNH PHẦN**

Lidocain HCl 1%, Clorocresol 0,1%, Cetylpyridinium 0,02%

**CÔNG DỤNG, CÁCH DÙNG VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:**

Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.

**BẢO QUẢN:** Bảo quản trong bao bì kín, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

Mã vạch  
(nếu có)

HỘP 1 TỤY P 10 GAM



Gel bôi niêm mạc miệng

# Novoteeth

Giảm đau, giảm viêm do nhiệt miệng, viêm lợi, trề mọc răng



Lidocain HCl 1%  
Clorocresol 0,1%

Cetylpyridinium clorid 0,02%

Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Số lưu hành:

NSX:

HD:

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPCI HÀ NỘI  
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương,  
Thường Tín, Hà Nội



Lidocain HCl 1%  
Clorocresol 0,1%  
Cetylpyridinium clorid 0,02%

HỘP 1 TỤY P 10 GAM



Giảm đau, giảm viêm do nhiệt miệng, viêm lợi, trề mọc răng

# Novoteeth

Gel bôi niêm mạc miệng



Novoteeth  
Gel bôi niêm mạc miệng



 novocare  
Dedicated To Superior Quality  
Gel bôi niêm mạc miệng

**Novoteeth**

10 GAM

**THÀNH PHẦN**  
Lidocain HCl 1%, chlorocresol 0,1%, Cetylpyridinium 0,02%

**CÔNG DỤNG, CÁCH DÙNG VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:**  
Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.

**BẢO QUẢN:** Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

**Số lưu hành:**  
Để xa tầm tay trẻ em  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

 CPC1 HN  
Sản xuất tại:  
**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI**  
Cụm CN Hà Bình Phương, H. Thường Tín, Hà Nội





Hướng dẫn sử dụng

Gel bôi niêm mạc miệng

**Novoteeth**

**Giới thiệu**

Gel bôi niêm mạc miệng Novoteeth là một loại gel trong, màu hồng dùng cho răng miệng, giúp giảm đau răng do mọc răng và đau do loét miệng

**Thành phần:**

*Lidocain HCl 1%, clorocresol 0,1%, cetylpyridinium clorid 0,02%  
ethanol, glycerin, hydroxypropyl cellulose, Natri saccharin, ponceau 4R, nước tinh khiết*

**Chỉ định:**

- Giúp giảm đau tạm thời do loét miệng tái phát và kích ứng do răng giả
- Giúp giảm đau và khó chịu liên quan đến răng như sâu răng, viêm răng, trống răng, mọc răng, viêm lợi, miệng do chân tay miệng. Có thể dùng cho trẻ em từ 5 tháng tuổi

**Chống chỉ định:**

Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm

**Hướng dẫn sử dụng:**

Người lớn và người cao tuổi: Bôi một lượng nhỏ vừa đủ vào vùng răng lợi bị đau bằng đầu ngón tay sạch, các lần nên cách nhau ít nhất 3 giờ

Trẻ mọc răng và trẻ em: Bôi một lượng nhỏ gel vừa đủ vào vùng răng bị đau bằng đầu ngón tay sạch, có thể dùng lặp lại sau 3 giờ nếu cần thiết. Tối đa là 6 lần trong 24 giờ

Trẻ khó ăn uống do mọc răng, đau răng: Bôi một lượng nhỏ gel vừa đủ trước mỗi bữa ăn 5 phút.

Không nên dùng quá 7 ngày

**Thận trọng:**

Tránh tiếp xúc với mắt, để nơi khô thoáng và mát. Thận trọng khi sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

**Bảo quản:** Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C



Sản xuất tại:

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI**

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Thường Tín, Hà Nội