https://trungtamthuoc.com/

Omk1®

Citicoline và Axit Hyaluronic

MEDEXPORT ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ITALY
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chai 10 ml e

Thành phần:
Lọ 10ml có chứa:
Citicoline natri, 0,2g;
Natri hyaluronat 0,02g

Sodium phosphate monobasic monohydrate, Sodium phosphate dibasic dodecahydrate, Sodium chloride, Benzalkonium chloride, nước vô trùng.

Đóng gói:
Hộp 1 lọ x 10ml

OMK1® trông như thế nào
OMK1® là dung dịch nhỏ mắt vô trùng đóng trong lọ 10 ml.

Nó là gì
OMK1® là dung dịch nhỏ mắt có chứa 2% Citicoline và Acid hyaluronic trọng lượng phân tử cao 0,2%
OMK1® có Citicoline trong thành phần, giúp khôi phục cấu trúc một cách hữu hiệu màng tế bào bị tổn thương do các bệnh lý thoái hóa, như bệnh tăng nhãn áp Glaucom.
Hơn nữa, thành phần OMK1® có chứa Acid hyaluronic có thể tạo môi trường vi mô thuận lợi cho các quá trình khôi phục bề mặt mắt trong trường hợp bị tổn thương giác mạc và biểu mô kết mạc.
Thực tế, Acid hyaluronic thu được bằng tổng hợp sinh học và tạo ra dung dịch có độ nhầy, bám dính và độ nhớt, giúp cải thiện độ ổn định màng phim nước mắt và do đó duy trì độ trơn cho bề mặt mắt, tạo ẩm và bảo vệ mắt.

Khi nào nên sử dụng OMK1®
OMK1®, nhờ sự có mặt của Citicoline và tác động của nó lên các tế bào hạch võng mạc, được chỉ định trong phối hợp điều trị với các thuốc hạ nhãn áp trên bệnh nhân Glaucom.
Hơn nữa, tính chất tạo ẩm và bảo vệ của sản phẩm giúp làm giảm cảm giác kích ứng, nóng rát và có dị vật gây ra bởi các yếu tố môi trường, phẫu thuật mắt hoặc viêm kết mạc.

Sử dụng bao nhiêu và sử dụng như thế nào
Nhỏ 1 giọt x 3 lần/ngày, khi cần.

https://trungtamthuoc.com/

Thận trọng và Cảnh báo

- Không sử dụng nếu lọ bị hư hỏng.
- Không sử dụng trong trường hợp mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
- Không sử dụng sau ngày hết hạn ghi trên bao bì.
- Tránh đầu lọ tiếp xúc vào mắt khi nhỏ mắt.
- Mờ mắt tạm thời có thể xảy ra sau khi nhỏ mắt. Nên đợi vài giây trước khi bắt đầu bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến việc quan sát.
- Đợi khoảng 10 - 15 phút sau khi sử dụng sản phẩm, sau đó mới sử dụng thuốc nhỏ mắt dùng tại chỗ khác.
- Sản phẩm sử dụng trong vòng 30 ngày sau khi mở nắp.
- Giữ sản phẩm tránh xa tầm với và tầm nhìn của trẻ em.
- Sản phẩm chỉ dùng cho nhỏ mắt.
- Bảo quản ở nhiệt độ dưới 25oC.
- Vứt lọ sau sử dụng đúng nơi quy định.
- Sản phẩm có chứa Benzalkonium chloride (0,01%).
- Benzalkonium chloride, ngay cả ở nồng độ thấp, có thể gây kích ứng mắt, đặc biệt ở những người bị khô mắt mãn tính hoặc bệnh giác mạc. Nếu gặp phải cảm giác bất thường, nóng rát hoặc đau sau khi sử dụng thuốc nhỏ mắt này, hãy liên hệ với bác sĩ. Trong trường hợp sử dụngkéo dài, những bệnh nhân bị khô mắt mãn tính hoặc bệnh giác mạc cần được theo dõi.
- Benzalkonium chloride có thể được hấp thụ bởi kính áp tròng mềm và có thể làm đổi màu. Nên tháo kính áp tròng trước khi sử dụng sản phẩm và đợi 15 phút trước khi đeo lại.

Hạn dùng:
36 tháng

Nhà sản xuất:
Omikron Italia S.r.l
Via Flaminia Nuova, 1068 – 00189 Rome – Italia sản xuất tại địa chỉ:
Công ty Farmigea S.p.A, địa chỉ G.B, Oliva, 8 – 56121 Pisa (PI) Italy.

Ngày duyệt toa: 03/2025

Bằng sáng chế tại Châu Âu EP2538918
Bằng sáng chế tại Mỹ US8822429
Bằng sáng chế tại Nhật JP5801324

CE 0546 STERILE A