



Mẫu nhãn hộp 10 gói thuốc bột : **Oremute 20**
Kích thước : 120 x 90 x 120 mm
Màu sắc : như mẫu



TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐS: Trần Đình Hương



05/136

Mẫu nhãn gói : **Oremute 20**

Kích thước : 110 x 83 mm

Màu sắc : như mẫu

Oremute 20
Thuốc bột uống bù nước và điện giải



HASAN

Oremute 20
Thuốc bột uống bù nước và điện giải

Thành phần:

Natri clorid	2600 mg
Natri citrat dihydrat	2900 mg
Kali clorid	1500 mg
Glucose khan	13500 mg
Kẽm	20 mg
(tương đương Kẽm gluconat	140 mg)
Khối lượng gói	20460 mg

Chỉ định:

- Bổ sung kẽm giúp chống phục hồi, tăng cường sức khỏe, giảm nguy cơ mắc đợt tiêu chảy mới trong những tháng tiếp sau.
- Hỗ trợ điều trị mất chất điện giải và nước trong tiêu chảy cấp từ nhẹ đến trung bình.

Cách dùng:

Hòa tan cả gói vào 1000 ml nước đun sôi để nguội.

Dùng theo chỉ dẫn của bác sĩ hoặc uống để bổ sung kẽm, phòng mất nước và chất điện giải sau mỗi lần đi ngoài.

Bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Số lô SX - HD:

CTY TNHH LIÊN DOANH HASAN - DERMAPHARM

Lô B, Đường số 2, KCN Đồng An, Bình Dương, Việt Nam.

Y TẾ
AN LÝ D
IÊN DU
CỘNG H
HỘI CH
H
S
M
T. B
022006

140 x 200 mm

Hướng dẫn sử dụng thuốc

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc khi dùng



Thuốc bột uống bù nước và điện giải

Thành phần

Natri clorid	2600 mg
Natri citrat dihydrat	2900 mg
Kali clorid	1500 mg
Glucose khan	13500 mg
Kẽm	20 mg
(tương đương Kẽm gluconat	140 mg)
Khối lượng gói	20640 mg

Được lực học

- Đối với người bệnh bị tiêu chảy, chỉ định đầu tiên và quan trọng nhất là bù nước và các chất điện giải. Nước và các chất điện giải bị mất do tiêu chảy có thể được bù lại bằng cách uống dung dịch có chứa natri, kali và glucose.
- Duy trì hệ thống đồng vận chuyển glucose – natri trong niêm mạc ruột non là cơ sở của điều trị bù nước và điện giải dạng uống. Glucose được hấp thu tích cực ở ruột bình thường và kéo theo natri được hấp thu theo tỉ lệ khoảng cân bằng phân tử. Bên cạnh đó, bù kali trong tiêu chảy cấp đặc biệt quan trọng ở trẻ em, vì trẻ mất kali trong phân cao hơn người lớn. Clorid và citrat được thêm vào nhằm khắc phục nhiễm toan chuyển hóa do mất nước.
- Kẽm rất quan trọng cho hệ thống miễn dịch của trẻ, giúp rút ngắn thời gian, mức độ trầm trọng của tiêu chảy và ngăn chặn những đợt tiêu chảy mới trong vòng 2-3 tháng sau khi điều trị. Kẽm còn giúp cải thiện sự ngon miệng và tăng trưởng.

Được động học

Thuốc được hấp thu tốt từ đường tiêu hóa.

Chỉ định

- Bổ sung kẽm giúp chống phục hồi, tăng cường sức khỏe, giảm nguy cơ mắc đợt tiêu chảy mới trong những tháng tiếp sau.
- Hỗ trợ điều trị mất chất điện giải và nước trong tiêu chảy cấp từ nhẹ đến trung bình.

Liều dùng và cách dùng

Hoà tan cả gói vào trong 1000 ml nước đun sôi để nguội và dùng theo chỉ dẫn của bác sĩ hoặc uống để bổ sung kẽm, phòng mất nước và chất điện giải sau mỗi lần đi ngoài như sau:

- Bổ sung kẽm: Trẻ em > 6 tháng tuổi và người lớn: 20 mg kẽm/ngày tương ứng với 1 gói Oremute 20/ngày.
- Hỗ trợ điều trị mất chất điện giải và nước: có thể dùng kèm với Oresol để đảm bảo bổ sung đầy đủ chất điện giải và nước.

Lưu ý:

- Với trẻ nhỏ cần cho uống từng ít một, uống chậm và nhiều lần, uống liên tục cho đến hết liều đã qui định.
- Không nên cho uống một lúc quá nhiều, sẽ gây nôn.
- Nếu chưa hết 24 giờ, bệnh nhân đã uống hết liều qui định thì nên cho uống thêm nước trắng để tránh tăng natri huyết và đỡ khát.
- Dung dịch Oremute đã pha theo hướng dẫn không được pha loãng thêm với nước vì pha loãng làm giảm tính hấp thu của hệ thống đồng vận chuyển glucose – natri.
- Dung dịch đã pha chỉ dùng trong 24 giờ.

Chống chỉ định

- Vô niệu hoặc giảm niệu.
- Mất nước nặng kèm triệu chứng sốc.
- Tiêu chảy nặng (khi tiêu chảy vượt quá 30ml/kg thể trọng mỗi giờ).

- Nôn nhiều và kéo dài.
- Tắc ruột, liệt ruột, thủng ruột.
- Trẻ em < 6 tháng tuổi (có nguy cơ quá liều kẽm).

Thận trọng

- Người bệnh bị suy tim xung huyết, phù hoặc tình trạng giữ natri.
- Người bệnh suy thận nặng hoặc xơ gan.
- Trong quá trình điều trị, cần theo dõi cẩn thận nồng độ các chất điện giải và cân bằng acid base.
- Cần cho trẻ bú mẹ hoặc cho uống nước giữa các lần uống dung dịch bù nước và điện giải để tránh tăng natri huyết.

Tác dụng không mong muốn

- Chưa có nhiều thông báo về các phản ứng có hại xảy ra khi dùng thuốc uống bù nước và điện giải.
- Thường chỉ gặp nôn nhẹ, rất ít khi gặp tăng natri huyết, bù nước quá mức (mì mắt nặng).

Tương tác với các thuốc và các dạng tương tác khác

Tránh dùng thức ăn hoặc dịch khác chứa các chất điện giải như nước quả hoặc thức ăn có muối cho đến khi ngừng điều trị, để tránh dùng quá nhiều chất điện giải hoặc tránh tiêu chảy do thẩm thấu.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú

Không ảnh hưởng.

Tác dụng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc

Không ảnh hưởng.

Quá liều và cách xử trí

- Tăng natri – huyết: hoa mắt, chóng mặt, tim đập nhanh, tăng huyết áp, đau đầu, sốt cao, ... khi uống Oremute pha đậm đặc. Điều trị tăng natri huyết: truyền tĩnh mạch chậm dịch nhược trương và cho uống nước.
- Triệu chứng thừa nước: mí mắt húp nặng, phù toàn thân, suy tim. Điều trị thừa nước: ngừng uống dung dịch bù nước và điện giải và dùng thuốc lợi tiểu nếu cần.
- Độc tính cấp của kẽm xảy ra sau khi uống 1 liều > 40 mg kẽm/ngày: buồn nôn, nôn mửa, sốt, suy hô hấp. Dùng liều lớn trong thời gian dài làm suy giảm chức năng miễn dịch và thiếu máu. Các triệu chứng hạ huyết áp (chóng mặt, ngất xỉu), bệnh vàng da (vàng mắt hay da), phù phổi (đau ngực hay khó thở), ăn mòn và viêm màng nhầy miệng và dạ dày, loét dạ dày cũng đã được báo cáo.

Điều trị quá liều kẽm: tránh dùng các chất gây nôn hoặc rửa dạ dày. Nên sử dụng chất làm dịu triệu chứng viêm như sữa, các chất carbonat kiềm, than hoạt và các chất tạo phức chelat.

Trình bày: Hộp 10 gói x gói 20,64 g. Gói nhôm.

Bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn áp dụng: Tiêu chuẩn cơ sở.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Lưu ý

- Không dùng thuốc quá liều chỉ định.
- Không dùng thuốc quá hạn dùng trên bao bì.
- Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.
- Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

HASAN

CTY TNHH LIÊN DOANH HASAN - DERMAPHARM
Lô B, Đường số 2, KCN Đồng An, Bình Dương, Việt Nam

Để thuốc xa tầm tay của trẻ em



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh

TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐS: Trần Đình Hoàng

19-L-D-N-NG
HẠN
DÙNG

TH

ĐC
ET