

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 18 / 01 / 2013.

Tỷ lệ: 100%

THÀNH PHẦN:
Paracetamol 325mg
Thiamin nitrat 9mg
Clorpheniramin maleat 2mg
Tà được v.d 1 gói 1,5g
Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng và các thông tin khác: xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG ĐỂ XÀ TÂM TAY CỦA TRẺ EM
BẢO QUẢN:
Nơi khô, nhiệt độ 15°C - 30°C, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn : TCCS
SDK :

Panacopha

THUỐC CỐT

panacopha



5g, 1 x gói 20
Hộp 150
OHM-PMG

GMP-WHO
Hộp 20 gói x 1,5g

Panacopha



THUỐC CỐT



Chi nhánh CTCP ArmePhaco
XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM 150
112 Trần Hưng Đạo - 01 - TP. Hồ Chí Minh

MẪU NHÃN THUỐC

NHÃN HỘP

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
Đổ lượng thuốc cần uống vào cốc.
Cho tiếp nước nguội vào, cứ 1,5g thuốc tương ứng với 15-20ml nước.
Khuyến đầu và uống ngay.



NSX (Mfg.date):
Số to SX (Batch No):
HD (Exp.date):

Panacopha

GMP-WHO
Box of 20 sachets x 1,5grams

Panacopha



GRANULE

ArmePhaco JSC branch
PHARMACEUTICAL FACTORY 150
112 Tran Hung Dao Street - Dist 1 - Ho Chi Minh City

Ngày 17 tháng 12 năm 2012


Giám đốc cơ sở sản xuất thuốc
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



ĐS. Nguyễn Chí Minh Hằng

MẪU NHÃN THUỐC

NHÃN GÓI



Tỷ lệ: 100%

Ngày 17 tháng 12 năm 2012

Giám đốc cơ sở sản xuất thuốc

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



DS. Nguyễn Thị Kim Hằng

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PANACOPHA

Thuốc cốm

THÀNH PHẦN :

Paracetamol	325 mg
Thiamin nitrat	9 mg
Clorpheniramin maleat	2 mg
Đường trắng, Natri benzoat, Lactose, Tinh bột bắp, Jaune orangés, Saccharin, Vanilin . . . v.đ.....	1 gói1,5g

CHỈ ĐỊNH :

Cảm sốt, nhức đầu, sổ mũi.

LIỀU DÙNG : Khoảng cách tối thiểu giữa 2 lần uống là 4 - 6 giờ

- Từ 4 – 11 tháng tuổi : mỗi lần uống ¼ gói, ngày 3 - 4 lần.
- Từ 1 – 2 tuổi : mỗi lần uống 1/3 gói, ngày 3 - 4 lần.
- Từ 2 – 3 tuổi : mỗi lần uống ½ gói, ngày 3 - 4 lần.
- Từ 4 – 5 tuổi : mỗi lần uống 2/3 gói, ngày 3 - 4 lần
- Từ 6 – 8 tuổi : mỗi lần uống 1 gói, ngày 3 - 4 lần.
- Từ 9 – 10 tuổi : mỗi lần uống 1,2 gói, ngày 3 - 4 lần
- Người lớn và trẻ em trên 11 tuổi: mỗi lần uống 1 – 2 gói, ngày 3 – 4 lần.

* Chú ý: không được dùng để tự điều trị sốt cao (trên 39,5⁰C), sốt kéo dài trên 3 ngày hoặc sốt tái phát.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH :

- Quá mẫn với thành phần của thuốc.
- Người bệnh thiếu hụt glucose – 6 – phosphat dehydrogenase.
- Người bệnh nhiều lần thiếu máu hoặc có bệnh tim, phổi, thận hoặc gan.
- Viêm hậu môn, trực tràng hoặc chảy máu trực tràng.
- Người tăng nhãn áp, bí tiểu do rối loạn niệu đạo, tuyến tiền liệt.
- Phụ nữ cho con bú, trẻ sơ sinh, trẻ em dễ thiếu thán

* *Thận trọng :*

- Tiền sử thiếu máu.
- Phụ nữ có thai và cho con bú.
- Người già.
- Người bệnh phổi mạn tính, thở ngắn, khó thở, tắc môn vị tá tràng, nhược cơ
- Theo dõi chức năng thận trong trường hợp dùng kéo dài hoặc suy thận mặc dù không gặp độc tính thận nào do paracetamol ở những bệnh nhân trong điều kiện sử dụng bình thường
- Thuốc gây buồn ngủ, tránh dùng khi cần các hoạt động tỉnh táo.

TÁC DỤNG PHỤ :

- Buồn ngủ, an thần, khô miệng, chóng mặt, buồn nôn.
- Hiếm thấy các phản ứng dị ứng như ban đỏ, mề đay. Cần ngừng điều trị nếu xuất hiện bất cứ phản ứng dị ứng nào



Handwritten signature or mark.

- Dùng liều cao và kéo dài có thể gây tổn thương gan .
- Trong một số ít trường hợp riêng lẻ, paracetamol đã gây giảm bạch cầu trung tính, giảm tiểu cầu và giảm toàn thể huyết cầu.
- **Thông báo cho bác sĩ những tác dụng phụ gặp phải khi dùng thuốc.**

TƯƠNG TÁC THUỐC:

- Uống dài ngày liều cao paracetamol làm tăng nhẹ tác dụng chống đông của coumarin và dẫn xuất indandion.
- Dùng đồng thời phenothiazin và liệu pháp hạ nhiệt có khả năng gây hạ sốt nghiêm trọng ở người bệnh.
- Uống rượu quá nhiều và dài ngày có thể làm tăng nguy cơ paracetamol gây độc cho gan
- Thuốc chống co giật (phenytoin, barbiturat, carbamazepin) có thể làm tăng tính độc hại gan của paracetamol.
- IMAO
- Ethanol hoặc các thuốc an thần gây ngủ có thể tăng tác dụng ức chế hệ thần kinh trung ương của clorpheniramin

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

- Cần thận trọng khi dùng cho phụ nữ có thai, nhất là 3 tháng ở kỳ cuối phải được sự hướng dẫn của bác sỹ.
- Phụ nữ đang cho con bú, clorpheniramin có thể được tiết qua sữa mẹ và ức chế tiết sữa nên cần cẩn trọng khi dùng.

LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

- Thuốc gây buồn ngủ, tránh dùng khi cần các hoạt động tỉnh táo.

QUÁ LIỀU – XỬ TRÍ:

- Liều gây chết ở clorpheniramin khoảng 25 – 50mg/ kg thể trọng. Những triệu chứng, dấu hiệu quá liều: an thần, kích thích nghịch thường hệ thần kinh trung ương, loạn tâm thần, cơn động kinh, ngừng thở, co giật, tác dụng chống tiết acetylcholin, phản ứng loạn trương lực và trụy tim mạch, loạn nhịp.
- Nhiễm độc paracetamol có thể do dùng một liều độc duy nhất, hoặc do uống lặp lại liều lớn paracetamol (7,5 – 10 g / ngày, trong 1 – 2 ngày), hoặc do uống thuốc dài ngày.
- Buồn nôn, nôn và đau bụng thường xảy ra trong vòng 2 – 3 giờ sau khi uống liều độc của thuốc.

*** Điều trị :**

- Chuyển ngay đến bệnh viện.
- Rửa dạ dày để loại trừ ngay thuốc đã uống.
- Dùng càng sớm càng tốt chất giải độc N – acetylcystein uống hay tiêm tĩnh mạch.
- Điều trị triệu chứng và hỗ trợ chức năng sống, cần chú ý đến chức năng gan, thận, hô hấp, tim và cân bằng nước, điện giải



DUỐC

DT

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ
ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM**

- **Hạn dùng** : 24 tháng, kể từ ngày sản xuất.
- **Bảo quản** : Nơi khô, nhiệt độ 15⁰C – 30⁰C, tránh ánh sáng.
- **Tiêu chuẩn** : Tiêu chuẩn cơ sở.

TRÌNH BÀY:

Hộp 20 gói x 1,5 g , kèm toa hướng dẫn sử dụng



Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Armephaco

XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM 150

112 Trần Hưng Đạo - Q1 - TP. Hồ Chí Minh

ĐT : (08) 38367413 - 38368554

Fax : 84 - 8 - 38368437

Ngày 17 tháng 12 năm 2012

Giám đốc cơ sở sản xuất thuốc

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh



DS. Nguyễn Thị Kim Hằng

