

MẪU HỘP & VỈ

Số lô SX, ngày SX & hạn dùng được in phun trên hộp và dập nổi trên vỉ.

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 18/01/2013

THÀNH PHẦN:

- Nefopam hydroclorid 30 mg
- Tá dược v.d. 1 viên nén

CHỈ ĐỊNH:

Đau cấp và mạn tính, đau sau phẫu thuật, nhức răng, đau cơ - xương, đau do chấn thương và đau trong ung thư.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Quá mẫn với các thành phần của thuốc.
- Tiền sử co giật, bí tiểu, glaucoma.
- Trẻ em dưới 15 tuổi.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Uống thuốc lúc no.
- Liều thông thường: 1 - 3 viên x 3 lần/ ngày.
- Liều khởi đầu khuyến cáo:
2 viên x 3 lần/ ngày,
người già: 1 viên x 3 lần/ ngày.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG

R_x Prescription only

Box of 10 blisters of 10 tablets

PANEGASIS
Nefopam HCl 30 mg



CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT-STOCK COMPANY N°25

Mnl in: 448B Nguyễn Tất Thành St. - Dist 4 - HCMC - VN
Office: 120 Hai Bà Trưng St. - Dist. 1 - HCMC - VN
Tel: (08) 3941 4958 Fax: (08) 3941 5550

Uphace

THẬN TRỌNG:

Thận trọng khi dùng thuốc cho người cao tuổi.
Bệnh nhân suy chức năng gan hoặc thận.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Xem tờ hướng dẫn sử dụng trong hộp.

BẢO QUẢN: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ
không quá 30°C.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

SDK :

Số lô SX:

Ngày SX:

HD :

R_x Thuốc bán theo đơn

Hộp 10 vỉ x 10 viên nén

PANEGASIS
Nefopam HCl 30 mg



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW 25

SX: 448B Nguyễn Tất Thành - Q 4 - TP HCM - VN
VP: 120 Hai Bà Trưng - Q 1 - TP HCM - VN
ĐT: (08) 39414958 Fax: (08) 39415550

Uphace

PANEGASIS
Nefopam HCl 30 mg
SDK:
CTY CPDP TW25

PANEGASIS
Nefopam HCl 30 mg
SDK:
Uphace

PANEGASIS
Nefopam HCl 30 mg
SDK:
Uphace

PANEGASIS
Nefopam HCl 30 mg
SDK:
CTY CPDP TW25

PANEGASIS
Nefopam HCl 30 mg
SDK:
CTY CPDP TW25

PANEGASIS
Nefopam HCl 30 mg
SDK:
Uphace

Ngày 27 tháng 08 năm 2012

Tổng Giám Đốc



DS. Phan Xuân Kính

Tổng Giám Đốc

Tổng Giám đốc
CÔNG TY
CƠ PHÂN
DUỐC PHẨM
TW 25
ĐS. Phan Xuân

ĐS. Phan Xuân Kính