

352/157

MẪU NHÃN DỰ KIẾN

I. NHÃN HỘP:

CÔNG THỨC:
Menthol.....3mg
Eucalyptol.....0,5mg
Tá dược vừa đủ.....1 viên

CHỈ ĐỊNH:
Sát khuẩn vùng miệng và họng. Làm giảm các triệu chứng ho, viêm họng, đau họng, rát cổ, khản tiếng.

CÁCH DÙNG:
- Người lớn: 10 - 15 viên/ngày.
- Trẻ em: 3 - 8 viên/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH & CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM - SX theo TCCS.
Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

GMP-WHO
HỘP 50 VĨ x 10 VIÊN NGẬM

Pastitussin

CTCP HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
297/5 Lý Thường Kiệt-Q.11-TP. HCM-Việt Nam

Số lô SX:
Ngày SX:
HD :

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 6/2/17


CÔNG TY
CỔ PHẦN
HÓA - DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR
Số Đ. N. 0302533156 - CT. C.E. 2
QUẬN 11, TP. HỒ CHÍ MINH

MM



II. NHÃN VÍ:

(Số lô SX, hạn dùng in phun trên vỉ)



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC:

PASTITUSSIN Viên ngậm
CÔNG THỨC: Cho 1 viên - Menthol.....3 mg - Eucalyptol.....0,5 mg - Tá dược vừa đủ..... 1 viên. (Đường trắng, Carboxymethylcellulose sodium, Tale, Povidone, Magnesium stearate)
TÍNH CHẤT: PASTITUSSIN là sự kết hợp của 2 chất: - Menthol: có tác dụng sát khuẩn, làm giảm ho, giảm đau tại chỗ. - Eucalyptol: có tác dụng sát khuẩn.
CHỈ ĐỊNH: - Sát khuẩn vùng miệng và họng. Làm giảm các triệu chứng ho, viêm họng, đau họng, rát cổ, khàn tiếng.
CÁCH DÙNG: Ngậm viên thuốc cho tan từ từ trong miệng, không nên nhai hay nuốt. - Người lớn: 10 - 15 viên/ngày. - Trẻ em: 3 - 8 viên/ngày.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: - Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. - Trẻ em dưới 30 tháng. - Trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.
THẬN TRỌNG: - Thận trọng với bệnh nhân tiểu đường vì mỗi viên ngậm có chứa 0,75 g đường.
THỜI KỲ MANG THAI – CHO CON BÚ: Phụ nữ mang thai, phụ nữ cho con bú nên tham khảo ý kiến bác sỹ trước khi dùng.
TÁC DỤNG PHỤ: - Liều sử dụng chưa có tác dụng phụ. Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
TƯƠNG TÁC THUỐC: - Chưa thấy có tương tác giữa PASTITUSSIN với các thuốc khác. Để tránh tương tác giữa các thuốc, thông báo cho bác sỹ hoặc dược sỹ về những thuốc đang sử dụng.
QUÁ LIỀU & CÁCH XỬ TRÍ: - Nếu trường hợp quá liều xảy ra, đề nghị đến ngay cơ sở y tế gần nhất để nhân viên y tế có phương pháp xử lý.
HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không sử dụng thuốc hết hạn dùng.
BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.
TRÌNH BÀY: Hộp 50 vỉ x 10 viên.
Sản xuất theo TCCS Đề xa tâm tay trẻ em Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ.
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR 297/5 Lý Thường Kiệt - Q.11 - TP. Hồ Chí Minh

Ngày 25 tháng 03 năm 2014

Tổng Giám Đốc



DS. Huỳnh Thị Lan

TUO CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Đỗ Minh Hùng