https://trungtamthuoc.com/

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 01/12/2015

MẪU NHÃN

1. Nhãn vỉ 10 viên:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
M.S.D.N: 0101337659-C.T.C.P
ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC
DS. Phạm Thị Tuân

2. Nhãn hộp 10 vỉ:

https://trungtamthuoc.com/

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Viên nén bao phim

PHARTERPIN

2. Dạng bào chế: Viên nén bao phim

2. Công thức: Cho 1 viên nén bao phim

Terpin hydrat	100 mg
Natri benzoat	50 mg

Tá dược (Tinh bột sắn, talc, lactose, PVP, ethanol 95^0, magnesi stearat, pharmacoat 615, pharmacoat 606, PEG 6000, titan dioxyd, màu brilliant blue, aspartam) vừa đủ 1 viên

3. Chỉ định:

- Long đờm

4. Cách dùng và liều dùng

- Người lớn: uống 4 – 6 viên 1 ngày, chia làm 2 – 3 lần
- Trẻ em 7 – 15 tuổi: uống 1 – 3 viên/ ngày chia làm 2 – 3 lần

5. Chống chỉ định:

- Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao
- Quá mẫn với một trong các thành phần của thuốc

6. Tác dụng không mong muốn của thuốc:

- Terpin hydrat có thể gây kích ứng dạ dày
- Các Benzoate có thể gây ra những phản ứng quá mẫn: phản ứng trên hệ hô hấp đặc biệt ở những bệnh nhân nhạy cảm với hen do aspirin, phản ứng miễn dịch nổi mày đay
- Ở trẻ em khi dùng liều cao các benzoat có thể gây nôn, kích ứng
- Ở trẻ đẻ non các Benzoate có thể gây nguy cơ nhiễm acid máu

Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng

7. Thận trọng :

- Cận thận trong trường hợp tăng áp lực nội sọ
- Natri benzoat : dùng kéo dài làm tích lũy Na^+ vì có chứa khoảng 1/6 Natri

8. Tương tác thuốc:

- Tránh kết hợp với các thuốc có tác dụng làm khô dịch tiết (loại atropine)

9. Sử dụng cho người vận hành máy móc, tàu xe:

Không có tài liệu báo cáo về ảnh hưởng của thuốc đối với người lái xe và điều khiển máy móc

10. Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Không có tài liệu báo cáo về ảnh hưởng đối với phụ nữ có thai và cho con bú

11. Các đặc tính dược lực học:

- Terpin hydrat: thuốc làm long đờm, làm lỏng dịch tiết do kích thích trực tiếp các tế bào xuất tiết dịch phế quản
- Natri benzoat: làm lỏng dịch tiết do kích thích các receptor từ niêm mạc dạ dày để gây phản xạ phó giao cảm làm tăng tiết ở đường hô hấp.

12. Sử dụng quá liều:

- Terpin khi sử dụng liều cao (0.8 – 1.5 g/ ngày) sẽ làm giảm tiết đờm do co mạch phế quản
- Xử trí khi sử dụng quá liều: ngừng dùng thuốc và đến gặp bác sĩ

13. Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30^{0}C, tránh ánh sáng

14. Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

15. Đóng gói: hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

16. Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

Lô số 15, KCN Quang Minh, Xã Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Tel: 043.5250736

TUQ CỤC TRƯỞNG

P.TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thị Thu Thủy