

PHIL
INTER PHARMA

PHIL INTER PHARMA

No 25, street No. 8, VSIP, Thuan An, Binh Duong

Tel: 0650. 3767 040~ 044. Fax: 0650. 3767 039

MẪU NHÃN HỘP

Sản phẩm : Viên nang **PHILBICOM-E 100 viên**

Kích thước hộp : 110 x 115 x 56 mm

Tỷ lệ : 70%

Nội dung : như mẫu



WHO-GMP

10 vỉ x 10 viên nang mềm



Thành phần: Mỗi viên nang mềm chứa
Cao Vaccinium myrtillus.....50mg
DL-alpha tocopheryl acetate.....50mg

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định:
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản:
Bảo bì kín, nơi khô mát, dưới 30°C.

Đóng gói:
10 vỉ x 10 viên nang mềm/hộp.

Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

PHIL Sản xuất tại
CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA
25, đường số 8, khu công nghiệp
Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương

WHO-GMP

10 blisters x 10 soft capsules



Composition: Each soft capsule contains
Vaccinium myrtillus ext.....50mg
DL-alpha tocopheryl acetate.....50mg

Indications, administration, contraindications: See insert paper.

Storage:
Preserve in air-tight container in dry and cool place, below 30°C.

Package:
10 blisters x 10 soft capsules/box.

Keep out of reach of children.
Read insert paper carefully before using.

SDK:
Số lô SX:
NSK:
HD:



PHIL
INTER PHARMA


PHIL INTER PHARMA

No 25, street No. 8, VSIP, Thuan An, Binh Duong

Tel: 0650. 3767 040~ 044. Fax: 0650. 3767 039

MẪU NHÃN VĨ

Sản phẩm : Viên nang PHILBICOM-E
Kích thước vĩ : 107 x 56 mm
Tỷ lệ : 100%
Nội dung : như mẫu



Số lô SX, NSX, HD sẽ được dập nổi trên vĩ

Trần Đức Bằng

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ hay dược sĩ.
Để xa tầm tay trẻ em.*



Viên nang mềm PHILBICOM-E

SĐK:

■ **THÀNH PHẦN:** Mỗi viên nang mềm chứa:

Cao vaccinium myrtillus..... 50 mg
Dl-alpha-tocopheryl acetate..... 50 mg

Tá dược:

Dầu đậu nành, Lecithin, Dầu cọ, Dầu đậu nành hydro hóa một phần, Sáp ong trắng, Gelatin, Glycerin đậm đặc, D-sorbitol, Methyl paraben, Propyl paraben, Ethyl vanillin, Titan dioxyd, Màu xanh dương số 1, Màu vàng số 5, Màu đỏ số 40, Nước tinh khiết.

■ **CHỈ ĐỊNH**

Hỗ trợ điều trị, cải thiện thị lực một số bệnh về mắt:

- Cận thị tiến triển và cận thị thoái hóa.
- Bệnh lý võng mạc và các rối loạn mạch máu mắt liên quan đến tiểu đường và tăng huyết áp.
- Quáng gà, suy giảm điều tiết mắt, viêm giác mạc, đau nhức mắt, mỏi mắt do tiếp xúc nhiều với máy tính, ti vi, trong thời kỳ thi cử, tập trung lái xe.
- Rối loạn thị giác lúc mờ tối và ban đêm.
- Dực thủy tinh thể, thoái hóa hoàng điểm ở người lớn tuổi.

■ **LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG**

- Người lớn: 3 – 6 viên/ngày.
- Trẻ em từ 5 – 7 tuổi: dùng đến 4 viên/ngày.
- Trẻ em từ 8 – 12 tuổi: dùng đến 6 viên/ngày.

Thời gian điều trị là 20 ngày mỗi tháng, sau đó lặp lại nếu cần thiết.

■ **CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

Quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

■ **THẬN TRỌNG**

Không dùng quá liều khuyến cáo.

Nên hỏi ý kiến bác sĩ khi có hiện tượng rối loạn thị giác bất ngờ hay khi tình trạng rối loạn thị giác sẵn có trở nên xấu hơn.

■ **TƯƠNG TÁC THUỐC**

Chưa có thông tin về trường hợp tương tác thuốc xảy ra.

■ **PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ**

Nên tránh dùng thuốc này ở phụ nữ có thai và đang cho con bú.

■ **TÁC DỤNG PHỤ**

Rối loạn tiêu hóa: ợ nóng, buồn nôn và rối loạn tiêu hóa.

* Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

■ **BẢO QUẢN:** Trong hộp kín, nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C. Tránh ánh sáng.

■ **HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

* Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng.

■ **ĐÓNG GÓI:** 10 vỉ x 10 viên nang mềm/ hộp.

■ **TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:** Tiêu chuẩn cơ sở.

Sản xuất tại:

Công ty TNHH PHIL INTER PHARMA

Số 25, đường số 8, khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

