

llh

[illegible]

TP. ĐÀM BẢO CHẤT LƯỢNG



PHILBIO

CTY TNHH PHIL INTER PHARMA

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.
Indications, administration, contraindications and other information: See insert paper.

HD:

TP. ĐAM BẢO CHẤT LƯỢNG



LÊ THANH HIẾU

20

100 viên nang mềm



PHILBIO

Thành phần: Mỗi viên nano matcha

Acid ascorbic

Thiamine nitrate.....16mg.

Riboflavin.....

Pyridoxine hydrochloride.....3mg

Calcium pantothenate.....10mg

Nicotinamide.....	50mg
Quinacrine.....	15.0

Cyanocobalamin..... 15µg
Acid folic..... 15µg

Chế định: cách dùng, chống chỉ định

và các thông tin khác :

Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng

Bảo quản: Trong hộp kín, tránh ánh

sáng, ở nhiệt độ dưới 30°C

Đóng gói: hộp 1 lọ 100 viên nang mềm.

Để xa tấm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Sản xuất tại:

CTY TNHH PHIL INTER PHARMA

25, đường số 8, KCN Việt Nam -

Singapore, Binh Duong

SDK:

SO 10 \$X;
NSX.

HD:

100 soft capsules

PHILBIO

Composition: Each soft capsule contains	
Ascorbic acid.....	100mg
Thiamine nitrate.....	10mg
Riboflavin.....	10mg
Pyridoxine hydrochloride.....	3mg
Calcium pantothenate.....	10mg
Nicotinamide.....	50mg
Cyanocobalamin.....	15µg
Folic acid.....	15µg

Indications: administration, contraindications


Storage: In hermetic containers, protect from light, below 30°C

**Keep out of reach of children
Read insert paper carefully before use**

PHIL PHIL INTER PHARMA
INTER PHARMA



TP. HỒ CHÍ MINH CHẤT LƯỢNG





100 soft capsules

Composition: Each soft capsule contains

Ascorbic acid.....	100mg
Thiamine nitrate.....	10mg
Riboflavin.....	10mg
Pyridoxine hydrochloride.....	3mg
Calcium pantothenate.....	10mg
Nicotinamide.....	50mg
Cyanocobalamin.....	15µg
Folic acid.....	15µg

Indications, administration, contraindications and other information: See insert paper.

Số lô SX:

HD:

CTY TNHH PHIL INTER PHARMA



PHILBIO

WHO-GMP

100 viên nang mềm

PHILBIO

Thành phần: Mỗi viên nang mềm chứa
Acid ascorbic.....100mg
Thiamine nitrate.....10mg
Riboflavin.....10mg
Pyridoxine hydrochloride.....3mg
Calcium pantothenate.....10mg
Nicotinamide.....50mg
Cyanocobalamin.....15µg
Acid folic.....15µg
Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định
và các thông tin khác:
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng
Bảo quản: Trong hộp kín, tránh ánh
sáng, ở nhiệt độ dưới 30°C
Đóng gói:
hộp 20 vỉ x 5 viên nang mềm
Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước
khi dùng
Sản xuất tại:
CTY TNHH PHIL INTER PHARMA
25, đường số 8, KCN Việt Nam -
Singapore, Bình Dương
SDK:
Số lô sản:
NSX:
HD:



100 soft capsules

PHILBIO

Composition:
Each soft capsule contains
Ascorbic acid.....100mg
Thiamine nitrate.....10mg
Riboflavin.....10mg
Pyridoxine hydrochloride.....3mg
Calcium pantothenate.....10mg
Nicotinamide.....50mg
Cyanocobalamin.....15µg
Folic acid.....15µg
Indications, administration,
contraindications and other
information: See insert paper
Storage: In hermetic containers,
protect from light, below 30°C
Package:
box of 20 blisters x 5 soft capsules
Keep out of reach of children
Read insert paper carefully before use
PHIL PHIL INTER PHARMA
INTER PHARMA



Để xa tâm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

PHILBIO

SĐK:



THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang mềm chứa:

Hoạt chất:

Acid ascorbic.....	100 mg
Thiamine nitrate	10 mg
Riboflavin.....	10 mg
Pyridoxine hydrochloride.....	3 mg
Calcium pantothenate.....	10 mg
Nicotinamide.....	50 mg
Cyanocobalamin.....	15 µg
Acid Folic.....	15 µg

llh

Tá dược: Dầu đậu nành, Dầu Lecithin, Dầu cọ, Sáp ong trắng, Gelatin, Glycerin đậm đặc, D-sorbitol 70%, Ethyl vanillin, Titan dioxide, Màu vàng số 203, Màu vàng số 5, Màu đỏ số 40, Nước tinh khiết.

DẠNG BẢO CHẾ: Viên nang mềm

CHỈ ĐỊNH

Bổ sung Vitamin và khoáng chất trong những trường hợp sau:

Thể chất yếu, chán ăn, loạn dưỡng, mệt mỏi, đau ốm, trẻ nhỏ trong giai đoạn tăng trưởng, người già yếu.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Mỗi ngày 1 viên hoặc theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Bệnh gan nặng.

THẬN TRỌNG

- Dùng đúng liều lượng và cách sử dụng đã được chỉ dẫn.
- Có thể xảy ra hiện tượng dung nạp thuốc nếu bệnh nhân dùng liều cao vitamin C, do đó giảm liều sẽ dẫn tới thiếu vitamin C.
- Tiền sử loét dạ dày, bệnh đái tháo đường, gút hoặc suy gan.
- Người bị thiếu hụt glucose-6-phosphate dehydrogenase, có tiền sử sỏi thận, tăng oxalate niệu và loạn chuyển hóa oxalate, bị bệnh Thalassemia.

TƯƠNG TÁC THUỐC

- Acid folic có thể làm giảm nồng độ phenytoin trong huyết tương.
- Rượu có thể cản trở sự hấp thu của riboflavin (vitamin B₂) trong ruột non.
- Pyridoxin (vitamin B₆) làm giảm tác dụng của levodopa trong điều trị Parkinson.
- Dùng chung nicotinamide (vitamin PP) với thuốc gây độc cho gan có thể gây độc tính cho gan trầm trọng hơn.
- Sử dụng PHILBIO đồng thời với chất ức chế men khử HMG - CoA có thể làm tăng nguy cơ gây tiêu cơ vân.

- Dùng đồng thời với fluphenazine dẫn đến giảm nồng độ fluphenazine huyết tương.
- Sự acid - hóa nước tiểu sau khi dùng vitamin C có thể làm thay đổi sự bài tiết của các thuốc khác.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

PHILBIO có thể sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú dưới sự hướng dẫn của thầy thuốc.

ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Chưa có báo cáo về ảnh hưởng của thuốc đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Chưa có báo cáo về tác dụng không mong muốn của PHILBIO và chưa có trường hợp nào xảy ra nếu tuân theo đúng liều dùng.

Có thể xảy ra một số tác dụng không mong muốn: Buồn nôn, đỏ bừng mặt và cổ, ngứa, cảm giác rát bỏng, những tác dụng phụ này sẽ hết sau khi ngừng thuốc.

Sử dụng liều cao vitamin C (> 1 g mỗi ngày) có thể dẫn đến đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, tăng oxalate niệu và sỏi thận.

** Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn khi sử dụng thuốc.*

QUÁ LIỀU: Chưa có báo cáo về trường hợp quá liều xảy ra.

BẢO QUẢN: Bảo quản trong hộp kín, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ dưới 30°C.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

** Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng.*

ĐÓNG GÓI: 6 vi x 5 viên nang mềm/hộp.
20 vi x 5 viên nang mềm/hộp.
30 viên nang mềm/lọ.
100 viên nang mềm/lọ.

Sản xuất bởi

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Số 25, Đường số 8, Khu Công nghiệp Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Việt Hưng



LÊ THANH HIẾU

✓

