

Philiver

WHO-GMP

12 blisters x 5 soft capsules

Philiver



12 blisters x 5 soft capsules
CÔNG TY TNHH PHILIVER PHARMIA
Số 105 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM
Số 105 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM

Pyridoxine hydrochloride 50mg
Nicotinamide 5mg
Calcium pantothenate 5mg

INDICATIONS
Support in treatment of chronic liver diseases, fatty liver, cirrhosis, post liver diseases

ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS
See insert paper

STORAGE:
Store in a hermetic container, below 20°C, protect from light

PACKAGE:
5 Soft capsules/blister, 12 blisters/blister

Keep out of reach of children!
Insert insert paper carefully before using

PHIL. PHIL. INTER PHARMIA

105
105
105
105

MẪU NHÃN HỘP

Sản phẩm : Viên nang mềm PHILIVER

Kích thước hộp : 105 x 115 x 45 mm

Tỷ lệ : 70%

Nội dung : như mẫu

WHO-GMP

12 vỉ x 5 viên nang mềm

Philiver



BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 19/1/2013

Thành phần mỗi viên nang mềm:
Gai Carotene 200mg
Hàng ngày 1 viên/ngày 14 ngày 14 ngày 14 ngày
Pyridoxine hydrochloride 5mg
Nicotinamide 5mg
Calcium pantothenate 5mg

Chỉ định:
Điều trị hỗ trợ trong các bệnh sau: Viêm gan mạn tính, gan nhiễm mỡ, xơ gan, bệnh chuyển hóa, gút.

CÁCH DÙNG, CÁCH ỒN NHIỆM:
Trước bữa ăn, uống với nước.

HẠN QUẢN: Trung tâm Y tế, ở nhiệt độ 20-25°C, tránh ánh sáng.

Đóng gói:
1 viên nang mềm/ vỉ nhôm.
Đã ra đời tại Việt Nam.
Được Y tế hàng đầu sử dụng trước và sau đây.

Sản xuất tại
CÔNG TY TNHH PHIL. INTER PHARMIA
Số 105 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM
Việt Nam - Singapore - Bình Dương

TP. HCM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
CÔNG TY TNHH PHILIVER PHARMIA
Số 105 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM
Số 105 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM
TP. THANH HIỆU

Để xa tâm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ

PHILIVER

SĐK:

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang mềm chứa:

<i>Hoạt chất:</i>	Cao Carduus marianus	200mg
	(tương đương Silymarin 140mg, Silybin 60mg)	
	Thiamin nitrate	8mg
	Pyridoxine hydrochloride.....	8mg
	Riboflavin	8mg
	Nicotinamide	24mg
	Calci pantothenate	16mg

Tá dược: Dầu đậu nành, dầu lecithin, dầu cọ, sáp ong trắng, gelatin, glycerin đậm đặc, D-sorbitol 70%, ethyl vanilin, titan dioxyd, màu vàng số 4, màu vàng số 5, màu đỏ số 40, màu xanh dương số 1, nước tinh khiết.

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang mềm

CHỈ ĐỊNH

Điều trị hỗ trợ trong các bệnh sau: bệnh gan mạn tính, gan nhiễm mỡ, xơ gan, bệnh nhiễm độc gan.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Liều thông thường ở người lớn là mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 viên.

Liều có thể được điều chỉnh tùy theo tuổi bệnh nhân và mức độ trầm trọng của các triệu chứng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh nhân quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Bệnh gan nặng.

Loét dạ dày tiến triển.

Xuất huyết động mạch.

Hạ huyết áp nặng.

THẬN TRỌNG

- Dùng thuốc theo đúng liều lượng đã được chỉ dẫn.

- Trẻ em dùng thuốc phải có sự theo dõi của cha mẹ.

- Nếu xảy ra các phản ứng dị ứng, phải ngừng sử dụng thuốc ngay lập tức và tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc dược sĩ.

- Nếu các triệu chứng không được cải thiện dù đã dùng thuốc được một tháng, phải ngưng dùng và tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc dược sĩ.

- Thuốc này có chứa phẩm màu vàng số 4 (tartrazin). Nếu bệnh nhân có tiền sử nhạy cảm với thành phần này, nên hỏi ý kiến của bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng thuốc.

- Khi sử dụng nicotinamide với liều cao cho những trường hợp: Tiền sử loét dạ dày, bệnh túi mật, tiền sử có vàng da hoặc bệnh gan, bệnh gút, viêm khớp do gút, và bệnh đái tháo đường.

- Calci pantothenate có thể kéo dài thời gian chảy máu nên phải sử dụng rất thận trọng ở người có bệnh ưa chảy máu hoặc có nguy cơ chảy máu khác.

TƯƠNG TÁC THUỐC

- Pyridoxine làm giảm tác dụng của levodopa trong điều trị bệnh Parkinson.

- Pyridoxine có thể làm nhẹ bớt trầm cảm ở phụ nữ uống thuốc tránh thai.

- Thuốc tránh thai uống có thể làm tăng nhu cầu về pyridoxin.



- Rượu có thể gây cản trở hấp thu riboflavin ở ruột.
- Probenecid sử dụng cùng riboflavin gây giảm hấp thu riboflavin ở dạ dày, ruột.
- Sử dụng nicotinamide đồng thời với chất ức chế men khử HGM - CoA có thể làm tăng nguy cơ gây tiêu cơ vân (rhabdomyolysis).
- Sử dụng nicotinamide đồng thời với thuốc chẹn alpha - adrenergic trị tăng huyết áp có thể dẫn đến hạ huyết áp quá mức.
- Khẩu phần ăn và/hoặc liều lượng thuốc uống hạ đường huyết hoặc insulin có thể cần phải điều chỉnh khi sử dụng đồng thời với nicotinamide.
- Sử dụng nicotinamide đồng thời với các thuốc có độc tính với gan có thể làm tăng thêm tác hại độc cho gan.
- Không nên dùng đồng thời nicotinamide với carbamazepin vì gây tăng nồng độ carbamazepin huyết tương dẫn đến tăng độc tính.
- Không dùng calci pantothenate cùng với hoặc trong vòng 12 giờ sau khi dùng neostigmin hoặc những thuốc tác dụng giống thần kinh đối giao cảm khác.
- Không dùng calci pantothenate trong vòng 1 giờ sau khi dùng succinylcholin, vì calci pantothenate có thể kéo dài tác dụng gây giãn cơ của succinylcholin.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Chỉ nên dùng thuốc theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.

ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Không ảnh hưởng.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Các phản ứng có hại của thuốc rất hiếm gặp như: ban da, ngứa, mày đay, buồn nôn và nôn.

Thông báo cho bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Khi quá liều xảy ra, không có biện pháp giải độc đặc hiệu. Sử dụng các biện pháp thông thường như gây nôn, rửa dạ dày, điều trị triệu chứng và hỗ trợ.

BẢO QUẢN: Trong hộp kín, ở nhiệt độ dưới 30⁰C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

** Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng.*

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 12 vi, vi 5 viên.

Sản xuất bởi:

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Số 25, đường số 8, khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương.

TP. DẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

