


10/136

ĐD



Mẫu nhãn vỉ Phong Thấp ACP



Kích thước vỉ nhãn: 90 x 57 (mm)


Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2011



Giám Đốc

GIÁM ĐỐC

Ns: Phạm Phan Thanh Vân



Thành phần:
Hy thiêm (Herba Siegesbeckiae)600mg
Ngũ Gia Bì (Rhizoma Homalomenae)800mg
Thiên Niên Kiện (Cortex Acanthopanax trifoliati)300mg
Cẩu tích (Rhizoma Cistiti)50mg
Thổ Phục Linh (Rhizoma Smilacis Glabrae)50mg
Tà dược: Magnesi stearat, tinh bột sắnvừa đủ 1 viên
Tiêu chuẩn: TCCS

Tác dụng:
Trừ phong thấp, mạnh gân cốt.
Liều dùng - cách dùng:
Người lớn: 2 - 3 viên /lần. Ngày uống 3 lần
Trẻ em: 1 - 2 viên /lần. Ngày uống 3 lần
Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất
Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ dưới 35°C.

Kích thước: 125 x 74 x 40 (mm).

Phong thấp ACP
Để xoa bóp tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Phong thấp ACP
Viên nang

Điều trị các chứng phong thấp và xương khớp

5 vỉ x 10 viên nang

SDK:
Tiêu chuẩn: TCCS
Ngày SX:
Số lô SX:
HD:

933120600656

Phong thấp ACP
Viên nang

Điều trị các chứng phong thấp và xương khớp

5 vỉ x 10 viên nang

Phong thấp ACP
Cơ Sở Sản xuất
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC Á CHÂU
Đo Lộ - Yên Nghĩa - Hà Đông - Hà Nội
ĐT: 04.33513113 - Fax: 04.33511618 - Mail:a-chau@hn.vnn.vn



GIÁM ĐỐC

Ds: *Phạm Phan Thanh Vân*

T
L
D
D
U
Y

Tờ hướng dẫn sử dụng
Viên nang
Phong thấp ACP

Trình bày: Hộp 3 vỉ x 10 viên nang + 01 HDSD.
Hộp 5 vỉ x 10 viên nang + 01 HDSD
Công thức cho 1 viên:

Hy Thiêm (<i>Herba Siegesbeckiae</i>)	600 mg
Ngũ Gia Bì (<i>Rhizoma Homalomenae</i>)	800 mg
Thiên Niên Kiện (<i>Cortex Acanthopanax trifoliati</i>)	300 mg
Cầu tích (<i>Rhizoma Cibotii</i>)	50 mg
Thổ phục linh (<i>Rhizoma Smilacis glabrae</i>)	50 mg
Tá dược: Magnesi stearat, tinh bột sắn....	Vừa đủ 1 viên

Tác dụng: Trừ phong thấp, mạnh gân cốt.

Chỉ định: Điều trị các chứng phong thấp và đau nhức xương khớp.

Liều dùng - Cách dùng :

- Người lớn: 2 – 3 viên/lần. Ngày uống 3 lần.

- Trẻ em: 1 - 2 viên/lần. Ngày uống 3 lần.

Chống chỉ định: Mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

Tác dụng phụ: Có thể gây táo bón, nếu có hiện tượng bất thường khác nên ngừng sử dụng thuốc và hỏi ý kiến của Bác sĩ hoặc Dược sĩ.

Thận trọng: Các trường hợp: Âm hư nội nhiệt, táo bón, thận hư nhiệt nên hỏi ý kiến của Bác sĩ hoặc Dược sĩ trước khi sử dụng.

Kiêng kỵ: Không nên uống nước chè khi dùng thuốc này.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ dưới 35⁰ C.

Tiêu chuẩn: TCCS

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Cơ sở sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC Á CHÂU

Do Lô – Yên nghĩa – Hà Đông – Hà Nội

Tel: 04.33513113 Fax: 04.33511618

Email: a-chau@hn.vnn.vn



GIÁM ĐỐC

PHÓ CỤC TRƯỞNG Ds: Phạm Phan Thanh Vân

Nguyễn Văn Thanh

OC
T