

Không đầy item.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ hay dược sĩ.

Ngăn ngừa và điều trị tình trạng thiếu Calci

PHOTOMIT

SDK: VN-18427-14

■ THÀNH PHẦN

Mỗi ống 10ml chứa:

Calci lactat..... 500mg

Tá dược: Dung dịch Sorbitol, Enzymatically Modified Stevia, acid Malic, Natri benzoat, Hương ume, Nước tinh khiết.

■ DẠNG BẢO CHẾ

Dung dịch uống.

■ CHỈ ĐỊNH

- Ngăn ngừa và điều trị tình trạng thiếu Calci như loãng xương, tetany, còi xương.
- Cung cấp Calci cho phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú và trẻ em.

■ LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Người lớn: 1 ống x 2-3 lần/ngày

Trẻ em: 1 ống x 1-2 lần/ngày

■ CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Chống chỉ định dùng thuốc trong trường hợp: tăng Calci huyết, tăng Calci niệu nặng, suy thận nặng, galactose huyết.

■ THẬN TRỌNG

Tuân theo đúng liều lượng và cách dùng.

Trẻ em dùng thuốc dưới sự giám sát của người lớn.

■ TƯƠNG TÁC THUỐC

- Calci có thể làm giảm sự hấp thu các kháng sinh nhóm tetracyclin hoặc fluorid uống, do đó nếu dùng đồng thời các chế phẩm này thì phải dùng cách xa ít nhất là 3 giờ.
- Khi dùng đồng thời, vitamin D làm tăng hấp thu Calci.
- Ở những bệnh nhân đang dùng digitalis, dùng liều cao Calci uống có thể làm tăng nguy cơ loạn nhịp tim.

■ PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Sản phẩm này dùng an toàn cho phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú và trẻ em.

■ TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Một số hiếm trường hợp, rối loạn tiêu hóa nhẹ như đầy hơi, táo bón, tiêu chảy có thể xảy ra.

** Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.*

■ TÁC ĐỘNG TRÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Không có.

■ QUÁ LIỀU VÀ ĐIỀU TRỊ

Cho đến nay không có báo cáo về quá liều.

■ BẢO QUẢN

Trong hộp kín, ở nơi khô mát dưới 30°C, tránh ánh sáng.

■ ĐÓNG GÓI

Hộp 20 ống x 10ml.

■ HẠN DÙNG

36 tháng kể từ ngày sản xuất

Sản xuất bởi:



CHO-A PHARM.CO.,LTD.

318, Gwangjeong-ro, Haman-myeon, Haman-gun, Gyeongsangnam-do, Hàn Quốc