

Lần đầu: 23 / 3 / 2016

MAJ

Picy muc

Acetyl/cystein 200mg

CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO
166-170 Nguyễn Huệ, Tuy Hòa,
Phú Yên, Việt Nam

Thuốc cầm pha dung dịch uống
Hộp 10 gói 2g



9360145848

Granule for oral solution
Box of 10 sachets of 2g



6 / SDK / VISA: XX - XXXX - XX

Số 16 SX/ Công ty Cổ phần Bimmy

Ngày SX / M.T. Ngày / Tháng / Năm

HD/Exp. : Ngày / Tháng / Năm

HUỶNH TẤN NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC

Handwritten signature

PICYMUC
Acetylcystein 200mg

THÀNH PHẦN - Mỗi gói 2g chứa
Acetylcystein 200mg

CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH,
LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG
VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC
Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

BẢO QUẢN
Nơi khô, mát (dưới 30°C).
Tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN - TCCS.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO
166-170 Nguyễn Huệ, Tuy Hòa,
Phước Yên, Việt Nam

PICYMUC

Acetylcystein 200mg

Thuốc long đàm

Thuốc cầm pha dung dịch uống

Hộp 18 gói 2g



COMPOSITION

Each sachet of 2g contains
Acetylcystein 200mg

INDICATIONS, CONTRAINDICATIONS,
DOSAGE, ADMINISTRATION
AND OTHER INFORMATION
Read the leaflet inside.

STORAGE

In a dry, cool place (below 30°C).
Protect from light.

SPECIFICATION - In-house.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ THE LEAFLET CAREFULLY
BEFORE USING



8 936014 584859



PICYMUC

Acetylcystein 200mg

Mucolytic drug

Granule for oral solution

Box of 18 sachets of 2g



Số lô SX / Lot: 04.11.100 / SBR / YSCA - XX - XXXX - XX
Ngày SX / Mfg: 10/01/2024 / Tháng / Năm
HĐ / Exp. Ngày / Tháng / Năm

CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO
T. P. TUY HÒA - T. PH. PH. YÊN

HUỲNH TẤN NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC

Handwritten signature

PICYMUC

Acetylcystein 200mg

THÀNH PHẦN - Mỗi gói 2g chứa
Acetylcystein 200mg

CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH,
LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG
VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC
Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

BẢO QUẢN
Nơi khô, mát (dưới 30°C),
Tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN - TCCS.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO
186-170 Nguyễn Huệ, Tuy Hòa,
Phước Yên, Việt Nam

PICYMUC

Acetylcystein 200mg

Thuốc long đàm

Thuốc cổm pha dung dịch uống
Hộp 30 gói 2g



COMPOSITION

Each sachet of 2g contains
Acetylcystein 200mg

INDICATIONS, CONTRAINDICATIONS,
DOSAGE, ADMINISTRATION
AND OTHER INFORMATION
Read the leaflet inside.

STORAGE

In a dry, cool place (below 30°C).
Protect from light.

SPECIFICATION - In-house.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ THE LEAFLET CAREFULLY
BEFORE USING



8 19 3 6 0 1 4 1 5 8 4 8 5 9

PICYMUC

Acetylcystein 200mg

Mucolytic drug

Granule for oral solution
Box of 30 sachets of 2g




Số Đ. SK: 1800176704 - C.T. PHU PHARCO
Ngày SX: / / Ngày / Tháng / Năm
HD/ Exp: / / Ngày / Tháng / Năm

PHU PHARCO
CÔNG TY CỔ PHẦN
TUY HÒA - Đ. N. 4400176704 - C.T.

HUYỀN TẤN NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nhãn gói

MAS



HUỲNH TẤN NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC



Each sachet of 2g contains
Mỗi gói 2g chứa
Acetylcystein 200mg

1. Pour the granule in a glass
Cho thuốc vào ly



2. Add 50ml water into the glass
Cho thêm 50ml nước

3. Stir for a few seconds
Khuấy đều

4. Follow the prescribed dosage
Uống theo liều chỉ định



Storage in a dry,
cool place (below 30°C).
Keep out of reach of children.
Bảo quản nơi khô,
mát (dưới 30°C).
Để xa tầm tay trẻ em.

CÔNG TY CỔ PHẦN PYMPHARCO
166-170 Nguyễn Huệ, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Số lô SX/ Lot : ABMM/YY
HD/ Exp. : Ngày / Tháng / Năm

PICYMUC
Acetylcystein 200mg

Thuốc cầm pha dung dịch uống
Granule for oral solution



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ. Để xa tầm tay trẻ em.

PICYMUC (Acetylcystein 200 mg)



THÀNH PHẦN: Mỗi gói thuốc cốm 2 g chứa
Acetylcystein 200 mg

Tá dược: manitol, sorbitol, povidon, aspartam, hương cam, colloidal silicon dioxid.

DƯỢC LỰC HỌC

Acetylcystein dùng làm thuốc tiêu chất nhầy và thuốc giải độc khi quá liều acetaminophen. Thuốc làm giảm độ quánh của đờm ở phổi có mủ hoặc không bằng cách tách đôi cầu nối disulfua trong mucoprotein và tạo điều kiện thuận lợi để tổng đờm ra ngoài bằng ho, dẫn lưu tự thể hoặc bằng phương pháp cơ học.

DƯỢC ĐỘNG HỌC

Sau khi uống acetylcystein được hấp thu nhanh ở đường tiêu hóa và bị gan khử acetyl thành cystein và sau đó được chuyển hóa. Mô phổi và các dịch tiết phế quản có ái lực đặc biệt đối với acetylcystein, nồng độ có hiệu lực của thuốc đạt được khoảng 3 giờ sau khi uống. Acetylcystein và chất chuyển hóa chủ yếu được bài tiết qua thận.

CHỈ ĐỊNH

Bệnh lý hô hấp có đờm nhầy quánh như trong viêm phế quản cấp và mạn, làm sạch thường quy trong mở khí quản. Tiêu chất nhầy trong bệnh nhầy nhớt (xơ nang tuyến tụy).

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Người lớn và trẻ em trên 7 tuổi: mỗi lần uống 1 gói x 3 lần/ngày.

Trẻ em từ 2 - 7 tuổi: mỗi lần uống 1 gói x 2 lần/ngày.

Cách dùng:

- Hòa tan thuốc trong 50 ml nước.
- Sau khi tiếp xúc với không khí, dung dịch phải bảo quản ở 2 - 8°C để làm chậm oxy - hóa và phải dùng trong vòng 96 giờ.
- Phải pha dung dịch loãng ngay trước khi dùng và dung dịch này chỉ ổn định trong vòng 1 giờ.

THẬN TRỌNG

Người bệnh có nguy cơ phát hen. Bệnh nhân bị loét dạ dày - tá tràng.

Khi điều trị với acetylcystein, có thể xuất hiện nhiều đờm loãng ở phế quản, cần phải hút để lấy ra nếu người bệnh giảm khả năng ho.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Quá mẫn với acetylcystein. Tiền sử hen. Phenylketon niệu.

Trẻ em dưới 2 tuổi.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Việc kết hợp thuốc điều hòa chất nhầy và thuốc chống ho và/hoặc làm khô sự tiết đàm (tác dụng giống atropin) là không hợp lý.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Phụ nữ có thai: Điều trị quá liều acetaminophen bằng acetylcystein ở người mang thai có hiệu quả và an toàn, và có khả năng ngăn chặn được độc tính cho gan ở thai nhi cũng như ở mẹ.

Phụ nữ cho con bú: Thuốc dùng an toàn cho người cho con bú.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Không ảnh hưởng.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Liều cao có thể gây hiện tượng không dung nạp thuốc: đau dạ dày, buồn nôn, tiêu chảy. Nên giảm liều trong trường hợp này.

Thông báo cho thầy thuốc tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ

Quá liều acetylcystein có triệu chứng tương tự như triệu chứng của phản vệ nhưng nặng hơn nhiều: đặc biệt là giảm huyết áp. Quá liều acetylcystein xảy ra khi tiêm truyền quá nhanh và với liều cao. Điều trị quá liều theo triệu chứng.

HẠN DÙNG : 36 tháng kể từ ngày sản xuất
BẢO QUẢN : Nơi khô, mát (dưới 30°C). Tránh ánh sáng.
TIÊU CHUẨN : TCCS
TRÌNH BÀY : Hộp 10 gói, 18 gói, 30 gói x gói 2 g.



Công ty cổ phần PYMEPHARCO
166 - 170 Nguyễn Huệ, Tuy Hoà, Phú Yên

HUYỀN TẤN NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC