

PM Branin

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Để xa tầm tay trẻ em

THÀNH PHẦN: Mỗi viên chứa:

Cao khô Bacopa Monnieri: 150mg

tương đương 3g dược liệu khô

Tá dược vừa đủ 1 viên nang: gelatin, sodium propionate, calcium hydrogen phosphate, sodium lauryl sulphate, cellulose-microcrystalline, silica – colloidal anhydrous, water-purified, croscamellose sodium, magnesium stearate.

Các đặc tính dược lý:

Thành phần chính của Bacopa có tác dụng với não, và khả năng nhận thức là bacosides. Ngoài ra nó còn có nhiều thành phần khác như các alkaloids, saponins, và sterols. Bacosides có tác dụng tăng cường khả năng nhận thức (phát triển trí nhớ, khả năng học, và tập trung) nhờ vào thành phần Bacosides; Bacosides có thể tăng cường sự truyền thông của các kích thích thần kinh bằng cách hỗ trợ sự phục hồi các neuron thần kinh đã bị tổn thương qua các thúc đẩy hoạt động kinase, tổng hợp neuron, và phục hồi các hoạt động synap. Bacosides có tính chống oxy hóa, và có khả năng hồi phục các mô trong động mạch phổi. Các nghiên cứu tiền lâm sàng cũng như lâm sàng cho thấy Bacopa có thể điều trị trầm cảm và lo âu. Bacopa còn có tác dụng chống chứng động kinh, chống co giật.

Chỉ định: Cải thiện và duy trì các chức năng não và nhận thức bậc cao, bao gồm trí nhớ, khả năng học tập, tiến trình thông tin và khả năng tập trung. Hỗ trợ trong điều trị bệnh Alzheimer và Parkinson.

Liều dùng: Người lớn: 2 viên mỗi ngày; Trẻ em (từ 12 tuổi trở xuống): 1 viên mỗi ngày; hoặc theo hướng dẫn của thầy thuốc.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Không sử dụng.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Chưa có báo cáo.

Tương tác với các thuốc khác, các dạng tương tác khác: theo lý thuyết, có thể làm tăng hoạt động của các cytochrome P450 enzyme, và có thể làm tăng mức hóc môn thyroid.

Sử dụng quá liều: Chưa có báo cáo.

Chống chỉ định: Phụ nữ có thai và cho con bú. Bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, hoặc với các loại thảo dược thuộc họ Scrophulariaceae (figwort).

Phản ứng phụ: Hiếm gặp, nếu có thường là cảm thấy buồn nôn, khô miệng, khát nước.

Lưu ý: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng PM Branin. Nếu cần thêm chi tiết, vui lòng tham khảo ý kiến bác sỹ. Không sử dụng PM Branin sau ngày hết hạn dùng.

Dạng bào chế: Viên nang cứng

Đóng gói: 5 vỉ x 12 viên/hộp

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

Bảo quản: Bảo quản ở nhiệt độ dưới 25°C, để nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp, phòng chống ẩm.

Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn nhà sản xuất

Số đăng ký sản phẩm Dược phẩm tại Úc: AUST L 119773

Số đăng ký sản phẩm Dược phẩm tại Việt nam: VN-15009-12

Cơ sở sở hữu giấy phép lưu hành: PharmaMetics Products trực thuộc Max Biocare Pty Ltd - Lvl 28, No. 303 Collins St. Melbourne, VIC 3000 Australia

Nhà sản xuất: Probiotec Pharma Pty Ltd., No. 73-83 Cherry Lane, Laverton North VIC 3026 Australia.

