

Thuốc nhỏ mắt - Nhỏ mũi - Nhỏ tai  
**POEMA®**

Kết hợp kháng sinh & kháng viêm dành cho Mắt - Mũi - Tai

Thích hợp trong các trường hợp viêm có nguy cơ nhiễm trùng cao và có khả năng bị nhiễm vi khuẩn nguy hiểm

### THÔNG TIN SẢN PHẨM

**THÀNH PHẦN:** Mỗi lọ 10ml chứa:

- Neomycin sulfate .....	34.000 IU
- Dexamethason natri phosphate .....	10 mg
- Tá dược: Acid citric, natri hydroxid, natri clorid, thimerosal .....	vừa đủ

**DẠNG BÀO CHẾ:** Dung dịch nhỏ mắt, nhỏ mũi, nhỏ tai.

**QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:** Hộp 1 lọ 10ml.

#### DƯỢC LỰC HỌC

- ♦ POEMA (Neomycin sulfate – Dexamethason natri phosphate) là dung dịch corticosteroid- kháng sinh dùng tại chỗ sử dụng cho mắt, mũi, tai.
- ♦ Dexamethason là một glucocorticoid tổng hợp từ glucocorticoid tự nhiên, tác dụng chống viêm của nó được sử dụng trong rối loạn của nhiều hệ thống cơ quan.
- ♦ Neomycin sulfate là kháng sinh diệt khuẩn nhóm aminoglycoside.
- ♦ Việc sử dụng kết hợp thuốc có một thành phần chống nhiễm khuẩn trong chỉ định viêm có nguy cơ nhiễm trùng cao hoặc trường hợp có khả năng một số vi khuẩn nguy hiểm xuất hiện ở mắt, mũi, tai.
- ♦ Hoạt chất chống nhiễm trùng trong sản phẩm này có lực chống lại các chủng vi khuẩn gây bệnh thông thường: *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Haemophilus influenzae*, *Klebsiella/Enterobacter species*, *Neisseria species*.
- ♦ Sản phẩm không có đủ khả năng chống lại các chủng: *Pseudomonas aeruginosa*, *Serratia marcescens*, bao gồm cả *Streptococci*, *Streptococcus pneumoniae*.

**DƯỢC ĐỘNG HỌC:** Chưa có báo cáo

#### CHỈ ĐỊNH

- ♦ *Mắt:* Viêm kết mạc, viêm mí mắt, viêm túi lệ, viêm giác mạc. Ngừa nhiễm khuẩn trước & sau khi phẫu thuật, nhiễm khuẩn do chấn thương.
- ♦ *Mũi:* Viêm mũi dị ứng, đặc biệt các trường hợp chỉ đáp ứng với điều trị bằng corticoid. Viêm mũi, viêm xoang. Polyp mũi bị nhiễm.
- ♦ *Tai:* Viêm tai ngoài (không bị thủng màng nhĩ), đặc biệt các chủng eczema, nhiễm trùng ống tai. Viêm tai cấp vừa rạch màng nhĩ.

#### LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

(\*) Liều lượng - Thông tin kê toa

- ♦ *Mắt, mũi:* Điều trị tấn công: 1-2 giọt/lần, 2 giờ/lần. Điều trị duy trì: 1-2 giọt/lần x 4-6 lần/ngày.
- ♦ *Tai:* Rửa tai: người lớn 1-5 giọt/lần, 2 lần/ngày, trong 6-10 ngày. Trẻ em từ 1-2 giọt/lần, 2 lần/ngày tùy theo tuổi, trong 6-10 ngày. Hoặc để dung dịch tiếp xúc với tai trong vài phút (bằng cách đặt bóng hoặc gạc đã thấm dung dịch POEMA, đặt 2 lần/ngày). Không nên dùng áp lực để bơm thuốc vào tai.
- ♦ Đậy nắp sau khi sử dụng. Sử dụng thuốc trong vòng 30 ngày sau khi đã mở nắp lần đầu.

#### CHỐNG CHÍ ĐỊNH

- ♦ Poema chống chỉ định ở hầu hết các bệnh virus giác mạc và kết mạc: *Herpes simplex* giác mạc, *Vaccinia*, *Varicella*.
- ♦ Nhiễm trùng *Mycobacterium* mắt. Nhiễm nấm các cầu trúc mắt.
- ♦ Thủng màng nhĩ.
- ♦ Poema cũng chống chỉ định với người có tiền sử quá mẫn hoặc nghi ngờ quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc bao gồm cả sulfite và các corticosteroid khác.

#### THẬN TRỌNG

- ♦ Không dùng để viêm mắt.
- ♦ Không dùng để viêm da.
- ♦ Không dùng thuốc liên tục trong thời gian dài. Cần theo dõi nhân áp và thủy tinh thể khi sử dụng cho chỉ định các bệnh về mắt trên 10 ngày hoặc nhiều hơn 20ml.
- ♦ Phụ nữ có thai và cho con bú (xem PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ).
- ♦ Nha khoa: An toàn và hiệu quả ở bệnh nhân nha khoa chưa được xác định. Sử dụng cho trẻ dưới 2 tuổi xin hỏi ý kiến của thầy thuốc.

#### PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

- ♦ Chưa có nghiên cứu đầy đủ về việc sử dụng thuốc trên phụ nữ có thai. Vì vậy, không nên sử dụng thuốc trừ khi đó là cần thiết.
- ♦ Có thể có nguy cơ gây tác dụng phụ cho trẻ đang bú mẹ, vì vậy phải cân nhắc giữa việc ngừng sử dụng thuốc hay ngừng cho con bú.

#### ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Cần thận khi lái xe, hoạt động máy móc hoặc các hoạt động nguy hiểm khác. Thuốc nhỏ mắt chứa Neomycin và Dexamethason có thể gây mờ mắt. Nếu gặp phải mờ mắt nên tránh các hoạt động này.

#### TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Phản ứng phụ xảy với sự kết hợp Steroid – kháng khuẩn. Tác dụng phụ xảy ra có thể do thành phần steroid của thuốc, thành phần thuốc kháng sinh hoặc kết hợp cả hai. Phản ứng phản ứng do thành phần steroid là tăng nhân áp với khả năng phát triển thành Glucom, tổn thương thần kinh thị giác, sự hình thành cataract dưới bao và làm chậm lành vết thương.

**Thông báo cho bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc**

**TƯƠNG TÁC THUỐC:** Chưa có nghiên cứu tương tác đặc hiệu nào được tiến hành với thuốc nhỏ mắt Neomycin sulfate- Dexamethason natri phosphate. Đã có các báo cáo tương tác với Neomycin, Dexamethason dùng đường toàn thân. Tuy nhiên sau khi nhỏ mắt, Neomycin và Dexamethason hấp thu rất ít vào tuần hoàn chung và nguy cơ xảy ra tương tác là rất nhỏ. Cần thông báo cho bác sĩ bất kỳ thuốc nào được sử dụng đồng thời.

#### QUẢ LIỆU VÀ XỬ TRÍ:

Không có báo cáo.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh sáng.

**TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:** Tiêu chuẩn cơ sở.

**HẠN DÙNG:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất.