

POLYDEXA[®]

Dung dịch nhỏ tai - Giọt

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
NEU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ.**

THÀNH PHẦN: Cho 100ml

Neomycin sulphatelg tương đương 650 000 UI
Polymyxin B sulphate.....1 000 000 UI
Dexamethasone natri metasulphobenzoate.....0,1 g
Tá dược: Thiomersal, acid citric, natri hydroxide, macrogol 400, polysorbate 80, nước tinh khiết.

DẠNG BẢO CHẾ - QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Dung dịch nhỏ tai. Hộp 1 lọ 10.5 ml

CHỈ ĐỊNH

Điều trị tại chỗ viêm tai ngoài do nhiễm khuẩn (đặc biệt chàm nhiễm khuẩn ống tai ngoài) với màng nhĩ còn nguyên.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Thuốc này không được dùng nếu bệnh nhân:

- dị ứng với neomycin, polymyxin B, dexamethason hay bất kỳ thành phần nào của thuốc,
- màng nhĩ bị thủng,
- tai ngoài bị nhiễm virus (thủy đậu hoặc Herpes).

THẬN TRỌNG KHI DÙNG

Phải kiểm tra sự nguyên vẹn của màng nhĩ trước khi cho dùng thuốc.

Nếu bị thủng màng nhĩ, thuốc có thể tiếp xúc với cấu trúc của tai giữa và gây tác dụng độc tai bất hồi phục (điếc và mất thính giác).

Ngưng thuốc ngay nếu xảy ra phát ban da hay có bất kỳ dấu hiệu phản ứng dị ứng tại chỗ hoặc toàn thân.

Không nên dùng thuốc này đồng thời với các thuốc nhỏ tai khác.

Dung dịch này không được dùng để chích hoặc uống.

Khi dùng, tránh chạm ngón tay hoặc tai vào đầu ống nhỏ giọt nhằm giảm nguy cơ nhiễm khuẩn.

Vận động viên nên được khuyến cáo vì thuốc này chứa hoạt chất (dexamethasone) có thể cho kết quả dương tính với những xét nghiệm chống dùng chất kích thích.

Nếu bệnh không cải thiện sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân nên được khám lại để xem xét lại bệnh trạng và cách điều trị

TƯƠNG TÁC THUỐC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC

NHĂM TRÁNH CÁC TƯƠNG TÁC CÓ THỂ CÓ GIỮA NHIỀU THUỐC. CẦN BÁO CHO BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ CÁC ĐIỀU TRỊ KHÁC ĐANG THEO

PHỤ NỮ MANG THAI VÀ CHO CON BÚ

Thuốc này chỉ dùng trong thời kỳ mang thai hoặc cho con bú theo ý kiến bác sĩ. Nếu phát hiện thấy có thai, nên hỏi ý kiến bác sĩ vì chỉ bác sĩ mới đánh giá được sự cần thiết của việc điều trị.

NÓI CHUNG, TRONG THỜI GIAN MANG THAI HOẶC CHO CON BÚ NÊN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ TRƯỚC KHI DÙNG BẤT KỲ THUỐC NÀO.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

- Người lớn: 1 - 5 giọt, 2 lần/ngày.
 - Trẻ em: 1 - 2 giọt, tùy theo tuổi, 2 lần/ngày.
- Nhỏ thuốc vào tai bị bệnh vào buổi sáng và buổi tối.
Thời gian điều trị thường là 7 ngày.

Cách dùng: Dùng tại chỗ. Nhỏ tai.

Cách lắp ống nhỏ giọt:

- Cắt lớp bao đựng ống nhỏ giọt.
- Mở nắp lọ bằng cách kéo miếng kim loại theo chiều mũi tên, khi vòng kim loại bị tách ra, gỡ nắp đậy lọ thuốc.
- Lắp ống nhỏ giọt vào lọ.
- Tháo nắp đậy ống nhỏ giọt.

Không nên bóp ống nhỏ giọt quá mạnh

Làm ấm chai thuốc trong tay vài phút trước khi dùng để tránh những cảm giác khó chịu do tai tiếp xúc với dung dịch lạnh.

Đề nhỏ thuốc vào tai:

- Nghiêng đầu qua phía tai không đau để tai đau hướng lên trên.
- Nhỏ vài giọt thuốc vào tai đau.
- Kéo nhẹ nhiều lần trên vành tai để thuốc chảy sâu vào ống tai.
- Giữ nghiêng đầu trong khoảng 5 phút

Khi thẳng đầu trở lại, một ít thuốc có thể chảy ra, dùng giấy thấm lau khô.

Đậy nắp ống nhỏ giọt sau khi dùng.

Bỏ lọ thuốc khi hết thời gian điều trị; không giữ phần thuốc còn lại để dùng cho lần sau.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Phản ứng tại chỗ (kích ứng), dị ứng với kháng sinh (neomycin, polymyxin B).

Do có chứa thiomersal có nguy cơ bị chàm và phản ứng dị ứng; kích ứng da.

Nếu màng nhĩ bị thủng, biểu hiện điếc và mất thính giác
Chọn lọc vi khuẩn kháng thuốc và phát triển nhiễm nấm.

THÔNG BÁO CHO BÁC SĨ NHỮNG TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG THUỐC.

BẢO QUẢN - HẠN DÙNG

Hạn dùng: 36 tháng. Không dùng quá hạn ghi trên bao bì.

Bảo quản ở nhiệt độ phòng.

Tiêu chuẩn: Nhà sản xuất

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ.

Laboratoires BOUCHARA-RECORDATI
68 rue Marjolin
92300 LEVALLOIS - PERRET - FRANCE