

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ. Để xa tầm tay trẻ em.
Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của thầy thuốc.

Thuốc điều trị bệnh đục thủy tinh thể

POSOD Eye Drops

SDK: VN-18428-14

◆ THÀNH PHẦN

Mỗi lọ 10ml chứa:

Hạt chất

Kali iodid 30mg

(tương đương 22,9mg iodid)

Natri iodid 30mg

(tương đương 25,4mg iodid)

Tá dược:

Methyl paraben, Propyl paraben, Hypromellose 2910, Boric acid, Borax, Natri clorid, Nước pha tiêm.

◆ DẠNG BẢO CHẾ

Dạng dịch nhỏ mắt.

◆ ĐƯỢC LỰC HỌC

Iodid dùng toàn thân hay tại chỗ đều làm tăng chuyển hóa trong pha lê thể và có thể làm trong pha lê thể bị vẩn đục.

Hiệu quả của iodid đối với đục thủy tinh thể lão suy giai đoạn sớm chưa được xác định. Tuy nhiên, iodid có khả năng làm chậm tiến triển đục thủy tinh thể và ổn định thị lực.

◆ ĐƯỢC ĐỘNG HỌC

Tại chỗ:

Kali iodid khuếch tán nhanh vào pha lê thể (thử nghiệm trên mắt thỏ). Trong vòng 60 phút sau khi nhỏ, nồng độ Kali iodid trong thủy dịch là 0,25µmol/ml, 6,4% lượng iodid được tìm thấy trong thủy tinh thể, và 3,7% trong pha lê thể.

Toàn thân:

Hấp thu toàn thân sau khi nhỏ mắt chưa được nghiên cứu.

◆ CHỈ ĐỊNH

Thuốc nhỏ mắt POSOD được chỉ định dùng cho các bệnh nhân bị đục hoặc xuất huyết pha lê thể do tuổi tác, cận thị, tăng huyết áp, đái tháo đường, viêm quanh tĩnh mạch.

Dục thủy tinh thể mới khởi phát và tiến triển.

◆ LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Nhỏ 1 giọt vào mắt bị tổn thương, 1-3 lần mỗi ngày.

◆ CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không dùng POSOD cho những bệnh nhân sau:

- Bệnh nhân quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

- Bệnh nhân bị rối loạn chức năng tuyến giáp trạng.
- Phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú và trẻ em.

◆ CẢNH BÁO

- Chỉ dùng thuốc để nhỏ vào mắt.
- Tránh để đầu ống nhỏ giọt tiếp xúc trực tiếp với mắt.
- Giữ thuốc tránh xa tầm tay trẻ.
- Tránh dùng thuốc quá một tháng sau khi đã mở hộp.
- Không thay đổi bao bì đóng gói để tránh dùng nhầm.
- Ăn nhẹ nháng vào túi lệ sau khi nhỏ thuốc để giảm thiểu tác động toàn thân của thuốc.

◆ THẬN TRỌNG

- Tránh làm nhiễm bẩn thuốc, tránh để đầu ống nhỏ giọt chạm vào bất cứ bề mặt nào.
- Tháo kính sát trùng khỏi mắt trước khi dùng thuốc.

◆ TƯƠNG TÁC THUỐC

Chưa có tương tác thuốc nào được báo cáo.

◆ PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Chống chỉ định dùng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú.

◆ TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Thận trọng khi lái xe và vận hành máy móc ngay sau khi dùng thuốc vì có thể gây cảm giác bóng rít và chảy nước mắt.

◆ TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

- Tại chỗ: ngứa, cảm giác bóng rít và chảy nước mắt có thể xảy ra.
- Toàn thân: vì POSOD có chứa iodid do đó có thể gây ra cường giáp và phát ban dạng viêm nang bì.

* *Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.*

◆ QUA LIỀU

Chưa có báo cáo đặc biệt nào về tình trạng sử dụng thuốc quá liều.

◆ BẢO QUẢN

Trong hộp kín, nơi khô mát dưới 30°C. Tránh để thuốc tiếp xúc ánh sáng hoặc để nơi quá nóng.

◆ ĐÓNG GÓI

10ml/lọ/hộp.

◆ HẠN DÙNG

24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Hạn dùng sau khi mở nắp: 1 tháng.

* *Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng.*

Sản xuất bởi:

 **HANLIM PHARM.CO.,LTD.**

2-27, Yeongmun-ro, Cheoin-gu,
Yongin-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc

01104

16102B

P32228-11