

MẪU NHÃN CHAI 1000ml DUNG DỊCH
SÁT KHUẨN POVIDONE IODINE

Kích thước thực : 17,0 cm x 10,7 cm

lvt

Dung dịch sát khuẩn
Povidone Iodine

Povidone iodine 10% - Chai 1000 ml

SĐK :

Tiêu chuẩn : TCCS

Công thức : Povidone iodine tương ứng với Iod 10 g
Tá dược vừa đủ 1000 ml

Công dụng : Sát trùng da, vết thương. Tẩy rửa dụng cụ y tế.

Chống chỉ định : Những người tiền căn không dung nạp iod; Trẻ nhỏ dưới 2 tuổi; Phụ nữ có thai và cho con bú; Không dùng chung với các xà bông kiềm và những chất có chứa thủy ngân.

Cách dùng : Bôi lên vết thương 1 lần/ ngày

Bảo quản : Để nơi khô mát, dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Để xa tầm tay của trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Số lô SX :

Ngày SX :

HD :



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2

10 Công Trường Quốc Tế - Q.3

Thành Phố Hồ Chí Minh

Sản xuất tại Nhà máy GMP - WHO, số 930C2, Đường C, KCN Cát Lái, Q.2, TP. Hồ Chí Minh

KHÔNG ĐƯỢC UỐNG


Ngày 24 tháng 12 năm 2010
TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. *Lê Thanh Pử*

MẪU NHÃN CHAI 500ml CÓ NẮP BẬT

Kích thước thực: 8,8 cm x 9,0 cm



Ngày 24 tháng 12 năm 2010
TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. *Lê Thanh Sử*

NHÃN CHAI 500 ml CÓ VÒI XỊT

Kích thước thực : 8 cm x 11,5 cm

Dung dịch sát khuẩn

Povidone Iodine

Povidone iodine 10% - Chai 500 ml

SĐK :

Tiêu chuẩn: TCCS

CÔNG THỨC : - Povidone iodine tương ứng với Iod 5 g
- Tá dược vừa đủ 500 ml



KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

F.T. PHARMA

Povidone Iodine

Povidone iodine 10% - Chai 500 ml

CÔNG DỤNG:

- Sát trùng da, vết thương.
- Tẩy rửa dụng cụ y tế.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Những người tiền căn không dung nạp iod.
- Trẻ nhỏ dưới 2 tuổi.
- Phụ nữ có thai và cho con bú.
- Không dùng chung với các xà bông kiềm và những chất có chứa thủy ngân.

CÁCH DÙNG:

Dùng nguyên chất để bôi trực tiếp hoặc pha loãng 1/10 với nước hay dung dịch sinh lý để rửa vết thương hoặc pha loãng 2% với dung dịch sinh lý để tưới lên vết thương 1 lần/ngày.

Chú ý: Không dùng chung với các xà bông kiềm và những chất có chứa thủy ngân.

BẢO QUẢN: Để nơi khô mát, dưới 30°C, tránh ánh sáng

Số lô SX:

Ngày SX:

HD:

**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2
10 Công Trường Quốc Tế, Q.3, TP.HCM

Sản xuất tại nhà máy GMP - WHO số 990C2, đường C, KCN Cát Lái, Q.2, TP. HCM



Ngày 24 tháng 12 năm 2010
TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. *Lê Thanh Sĩ*

**MẪU NHÃN CHAI 90ml DUNG DỊCH
SÁT KHUẨN POVIDONE IODINE 10%**

Kích thước thực: 12,2 cm x 4,8 cm

Dung dịch sát khuẩn	
Povidone Iodine	
Povidone iodine 10% - Chai 90 ml	
SBK :	Tiêu chuẩn : TCCS
	
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 10 Công Trường Quốc Tế - Q.3, TP. HCM Sản xuất tại Nhà máy GMP - WHO, số 930C2, Đường C, KCN Cát Lái, Q.2, TP. Hồ Chí Minh	
Công thức : Povidone iodine tương ứng với Iod 0,9 g Tá dược vừa đủ 90 ml	
Công dụng : Sát trùng da, vết thương. Tẩy rửa dụng cụ y tế.	
Chống chỉ định : Những người tiền căn không dung nạp iod; Trẻ nhỏ dưới 2 tuổi; Phụ nữ có thai và cho con bú; Không dùng chung với các xà bông kiềm và những chất có chứa thủy ngân.	
Cách dùng : Bôi lên vết thương 1 lần/ ngày	
Bảo quản : Để nơi khô mát, dưới 30°C, tránh ánh sáng.	
KHÔNG ĐƯỢC UỐNG Để xa tầm tay của trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.	
Số lô SX :	HD :
Ngày SX :	HD :

Ngày 24 tháng 12 năm 2010
TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Lê Thanh Sĩ

**MẪU NHÃN CHAI 20ml DUNG DỊCH
SẮT KHUẨN POVIDONE IODINE 10%**

Kích thước thực: 7,5 cm x 2,3 cm



Ngày 24 tháng 12 năm 2010
TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. *Lê Thanh Sử*

**MẪU TOA HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
DUNG DỊCH SÁT KHUẨN POVIDONE IODINE 10%**

Kích thước thực : 9,2 cm x 13,5 cm

Povidone Iodine

Dung dịch sát khuẩn - Povidone iodine 10%

CÔNG THỨC : Cho 1 chai 20 ml

- Povidone iodine tương ứng với Iod 0,2 g
- Tá dược: Natri phosphat monobasic khan, Natri phosphat dibasic khan, Hydroxypropyl methylcellulose 615, Nước cất.

TÍNH CHẤT :

- Povidone iodine là một phức hợp hữu cơ có chứa 10% iod hoạt tính. Iod được phóng thích từ từ. Do đó tính sát trùng và diệt nấm của POVIDONE IODINE rất tốt và kéo dài.
- POVIDONE IODINE tác dụng trên Staphylococcus, Proteus, Clostridium, Colibacillus, Trichomonas, Candida albicans.
- POVIDONE IODINE tác dụng tốt trên các vết thương có máu mủ hay thối rữa.
- POVIDONE IODINE không bền ở môi trường kiềm và mất hoạt tính khi phối hợp với Natri thiosulfat ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$).

CHỈ ĐỊNH :

Sát trùng da, vết thương. Tẩy rửa dụng cụ y tế.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH :

- Những người có tiền căn không dung nạp iod.
- Trẻ nhỏ dưới 2 tuổi.
- Phụ nữ có thai và cho con bú.
- Không dùng chung với các xà bông kiềm và những chất có chứa thủy ngân.

THẬN TRỌNG :

Thận trọng khi dùng thường xuyên trên vết thương đối với người bệnh có tiền sử suy thận, đối với người bệnh đang điều trị bằng lithi.

TƯƠNG TÁC THUỐC :

- Tác dụng kháng khuẩn bị giảm khi có kiềm và protein.
- Tương tác với các hợp chất thủy ngân: Gây ăn da.
- Thuốc bị mất tác dụng với natri thiosulfat, ánh sáng mặt trời, nhiệt độ cao và các thuốc sát khuẩn khác.

Povidone Iodine

Dung dịch sát khuẩn - Povidone iodine 10%

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN :

Đôi khi gây kích ứng tại chỗ.

Thông báo cho bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ :

Không có thông tin.

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG :

Dùng nguyên chất để bôi lên da hoặc pha loãng 1/10 với nước hay dung dịch sinh lý để rửa vết thương (nhất là trong trường hợp vết thương có mủ hay bị thối rữa), hoặc pha loãng 2% với dung dịch sinh lý để tưới lên vết thương 1 lần/ngày.

HẠN DÙNG :

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI :

Chai 20 ml, 90 ml, 500 ml và 1000 ml.

BẢO QUẢN :

Để nơi khô mát, dưới 30°C, tránh ánh sáng.

- Dung dịch sát khuẩn Povidone Iodine 10% đạt theo Tiêu Chuẩn Cơ Sở.
- Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc.
- Sản xuất tại: Nhà máy GMP - WHO số 930C2, đường C, KCN Cát Lái, Q.2, TP.Hồ Chí Minh.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2

Số 10 Công Trường Quốc Tế, Q.3, TP. HCM

F.T. PHARMA Điện thoại: 38230512 - 39770965 - 39770966 - 39770967 Fax: 39770968

Email: duocpham32@ft-pharma.com Website: www.ft-pharma.com

Ngày 06 tháng 07 năm 2011
TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Lê Thanh Sử