

Ginseng Garlic Ginkgo
Powertona®
3G



Chống mệt mỏi

Tăng cường trí nhớ

Giảm xơ vữa động mạch



ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI
CÔNG TY CP KOREA UNITED PHARM, INT'L
THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM

SỐ ĐĂNG KÝ: V342-H12-13

Ginseng Garlic Ginkgo

Powertona® 3G



THÀNH PHẦN

Mỗi viên nang mềm chứa:

Cao Nhân sâm 60% (k/k) 40 mg
(Panax Ginseng extract) (Tương ứng 24 mg Ginsenosid)

Cao Bạch quả 95% (k/k) 40 mg
(Ginkgo biloba leaf extract) (Tương ứng 9.6 mg Ginkgo flavon)

Tinh dầu tỏi 10 mg
(Allium sativum oil)

Ta được: Dầu đậu nành, Sáp ong trắng, Dầu cọ, Lecithin, Gelatin, Glycerin đậm đặc, Methyl p-hydroxybenzoat, Propyl p-hydroxybenzoat, Ethyl vanillin, Titan oxyd, Màu xanh số 1 (Xanh Brilliant FCF), Màu vàng số 5 (Vàng Sunset FCF), Màu đỏ số 40 (Đỏ Alura), Màu vàng số 203 (Vàng Edicol quinolin), nước tinh khiết.

MÔ TẢ

Viên nang mềm hình thuôn dài, màu xanh - số có la, trong chứa dịch thuốc màu nâu.

CHỈ ĐỊNH

Điều trị giảm trí nhớ, kém tập trung, chóng hay quên, Giảm xơ vữa động mạch và rối loạn tuần hoàn động mạch ngoại biên.

Chống mệt mỏi, tăng sức đề kháng, chống lão hóa.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Mỗi lần 1 viên, ngày 2 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Phụ nữ có thai.

THẬN TRỌNG

Sử dụng thận trọng ở người cao huyết áp.

SỬ DỤNG THUỐC Ở PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Mặc dù nghiên cứu trên động vật cho thấy thuốc không có tác dụng gây quái thai, nhưng không nên sử dụng thuốc ở phụ nữ mang thai.

TÁC DỤNG PHỤ

Sử dụng thuốc đúng sự hướng dẫn sẽ không gây ra tác dụng phụ nặng nào.

Hiếm khi xảy ra tác dụng phụ như: chóng mặt, buồn

nôn, đánh trống ngực, dị ứng da.

Thông báo cho bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Tinh dầu tỏi và Cao Bạch quả đều có tác dụng chống kết tập tiểu cầu do đó cần sử dụng thận trọng với những bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông máu. Nhân sâm có thể xảy ra tương tác với các thuốc sau đây: Warfarin, Phenelzin (IMAD) và Digoxin. Tuy nhiên, điều này chưa được minh chứng rõ ràng trên lâm sàng.

QUẢ LIỆU

Thành phần, hoạt chất của thuốc không độc. Chưa có nghiên cứu về xử lý quả liều ở người và động vật.

HẠN DÙNG

24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng thuốc quá hạn sử dụng ghi trên hộp.

BẢO QUẢN

Bảo quản ở nhiệt độ phòng không quá 30°C.

Đóng gói

5 Viên nang mềm/Vi x 1 Vi/Hộp.

5 Viên nang mềm/ Vi x 6 Vi/Túi nhôm x 1 Túi nhôm/Hộp.

5 Viên nang mềm/ vi x 6 Vi/Túi nhôm x 2 Túi nhôm/Hộp.

TIÊU CHUẨN

TCCS.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến Bác sĩ, Dược sĩ.

Sản xuất tại Công ty cổ Phần
KOREA UNITED PHARM. INTL

Số 2A, Đại lộ Tự Do, Khu công nghiệp Việt Nam -
Singapore, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam.

Theo những quyền của
KOREA UNITED PHARM. INC.

Trụ sở chính: 154-8, Nonhyun-Dong, Kangnam-Gu,
Seoul, Hàn Quốc.

Nhà máy: 25-23, Nojanggongdan-gil,
Jeondong-myeon, Sejong-si, Hàn Quốc.