

*Dung dịch rửa mắt*

## **PRETTY-EYE**

### **Thành phần:**

Công thức bào chế cho 100 ml thành phẩm:

Natri clorid.....	0,46 g
Calci clorid.2H <sub>2</sub> O.....	0,048 g
Kali clorid.....	0,075 g
Magnesi clorid.....	0,03 g
Natri acetat.3H <sub>2</sub> O.....	0,647 g
Natri citrat.2H <sub>2</sub> O.....	0,17 g

(Tá dược: Benzalkonium clorid, Trilon B, Menthol, Natri hydroxyd, Nước cất vừa đủ)

**Dạng bào chế:** Dung dịch rửa mắt.

**Qui cách đóng gói:** Hộp 1 lọ 10 ml.

### **Các đặc tính dược lực học:**

- Pretty-Eye chứa các thành phần tương tự nước mắt, được ử dụng để rửa mắt giúp loại trừ bụi bẩn, hóa chất, các chất ô nhiễm từ môi trường xâm nhập vào mắt. Nhằm phòng ngừa các tổn thương trên mắt đồng thời duy trì độ ẩm cần thiết cho mắt.

### **Các đặc tính dược động học:**

- Khi nhỏ vào mắt thuốc hầu như không hấp thu, có tác dụng rửa trôi bụi bẩn đồng thời tạo độ ẩm cho mắt.

### **Chỉ định:**

- Pretty-Eye được dùng trong các trường hợp: khô mắt, sau hậu phẫu, thường xuyên sử dụng máy vi tính... Nhằm phòng ngừa các tổn thương trên mắt đồng thời duy trì độ ẩm cần thiết cho mắt.

### **Liều lượng và cách dùng:**

- Nhỏ từ 1 đến 2 giọt vào mỗi mắt, dùng 3 - 4 lần/ngày.

- Lưu ý: Không dùng thuốc sau khi mở nắp quá 15 ngày hoặc quá hạn sử dụng.

### **Chống chỉ định:**

- Dị ứng với một trong các thành phần của thuốc.

### **Thận trọng:**

- Không nên sử dụng khi mắc cảm với bất kì thành phần nào của thuốc.

### **Tương tác thuốc:**

- Không nên sử dụng cùng lúc nhiều loại thuốc nhỏ mắt để tránh các tương tác bất lợi có thể xảy ra.

**Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:** Thuốc sử dụng an toàn cho đối tượng này.

**Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy:** Không ảnh hưởng gì khi lái xe và vận hành máy.

### **Tác dụng không mong muốn:**

- Do có thành phần tương tự nước mắt nên hầu như không gây tác dụng phụ khi sử dụng.

Cần thông báo cho Bác sĩ nếu xảy ra tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng

**Quá liều và cách xử trí:** Thuốc không gây ảnh hưởng gì khi dùng quá liều.

**Hạn dùng:** 36 tháng (kể từ ngày sản xuất).

Không dùng thuốc quá hạn dùng in trên nhãn.

Nếu quan sát thấy dung dịch vẩn đục thì không được sử dụng.

**Bảo quản:** Kín, tránh ánh sáng.

### **ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM**

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**

**NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ**

*Sản xuất tại:*

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)**

**Số 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam**

**ĐT: 056.3846040 \* Fax: 056.3846846**