

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 12/6/2014

MẪU NHÃN SẢN PHẨM

Mẫu nhãn trên hộp.

312/145 lb

Promethazin 2% kem bôi da	5g Promethazin 2% Kem bôi da  Sản xuất tại: CÔNG TY CP DƯỢC VITYT HẢI DƯƠNG 102 Chi Lăng - TP Hải Dương. ĐT: (0320).3853848.	Thành phần: Mỗi tuýp kem 5g có chứa: Promethazin hydroclorid100mg Tá dược vừa đủ.....5g Chỉ định, Chống chỉ định, Liều dùng - cách dùng và các thông tin khác: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.	Bảo quản : Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng Tiêu chuẩn chất lượng : TCCS ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG SĐK: THUỐC DÙNG NGOÀI
	5g Promethazin 2% Topical Cream  Manufactured by: HAI DUONG PHARMACEUTICAL MEDICAL MATERIALS.,JSC Add: 102 Chi Lang, Hai Duong city. Tel: (+84).0320.3853848		
Composition: Each tube 5g cream contains: Promethazin hydroclorid100mg Excipients q.s.....5g Indication, Contraindication, Dosage - Administration add Another information: Please the insert paper.		Storage: Keep in dry place, at temperature not over 30°C, protected from light. Standards: Manufacturer's KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN READ INSERT PAPER CAREFULLY BEFORE USE Reg.No: FOR EXTERNAL USE	

Mẫu nhãn trên tuýp

Tuýp 5g Promethazin 2% kem bôi da  Sản xuất tại: CÔNG TY CP DƯỢC VITYT HẢI DƯƠNG 102 Chi Lăng - TP Hải Dương. ĐT: (0320).3853848.	Thành phần: Mỗi tuýp kem 5g có chứa: Promethazin hydroclorid100mg Tá dược vừa đủ.....5g Bảo quản : Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng Tiêu chuẩn chất lượng : TCCS ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG THUỐC DÙNG NGOÀI SĐK: Số lô SX: Ngày SX: HD:
--	--

MẪU NHÃN SẢN PHẨM

Mẫu nhãn trên hộp.

Promethazin 2% Kem bôi da	10g Promethazin 2% Kem bôi da Sản xuất tại: HD PHARMA CÔNG TY CP DƯỢC VTYT HẢI DƯƠNG 102 Chi Lăng - TP Hải Dương. ĐT: (0320).3853848.	Thành phần: Mỗi tuýp kem 10g có chứa: Promethazin hydroclorid200mg Tá dược vừa đủ.....10g Chỉ định, Chống chỉ định, Liều dùng - cách dùng và các thông tin khác: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng. Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG SDK: THUỐC DÙNG NGOÀI
	10g Promethazin 2% Topical Cream Manufactured by: HD PHARMA HAI DUONG PHARMACEUTICAL MEDICAL MATERIALS.,JSC Add: 102 Chi Lăng, Hai Duong city. Tel: (+84).0320.3853848	Số lô SX: Ngày SX: HD:
Composition: Each tube 10g cream contains: Promethazin hydroclorid200mg Excipients q.s.....10g Indication, Contraindication, Dosage - Administration add Another information: Please the insert paper. Storage: Keep in dry place, at temperature not over 30°C, protected from light. Standards: Manufacturer's KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN READ INSERT PAPER CAREFULLY BEFORE USE Reg.No: FOR EXTERNAL USE		

Mẫu nhãn trên tuýp

10g Promethazin 2% Kem bôi da Thành phần: Mỗi tuýp kem 10g có chứa: Promethazin hydroclorid200mg Tá dược vừa đủ.....10g Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG Sản xuất tại: HD PHARMA CÔNG TY CP DƯỢC VTYT HẢI DƯƠNG 102 Chi Lăng - TP Hải Dương. ĐT: (0320).3853848.	THUỐC DÙNG NGOÀI SDK: Số lô SX: Ngày SX: HD:
---	--

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PROMETHAZIN 2%

Dạng bào chế: Kem bôi da

Thành phần: Cho 1 tuyp 5g:

Promethazin hydroclorid100mg

Tá dược (Cetyl alcohol, Stearic acid, Lanolin khan, Propylen glycol, Nipagin, Lavender oil, Triethanolamin, nước cất.....vd 5g.

Chỉ định: Điều trị các chứng ngứa ngoài da như: Mẩn ngứa, mề đay, côn trùng đốt.

Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với thành phần của thuốc.
- Bệnh ngoài da có nhiễm trùng hoặc kích ứng.
- Chàm, các tổn thương chảy nước.

Tác dụng không mong muốn:

Có thể gây mẫn cảm ở da hoặc mẫn cảm với ánh sáng.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Liều dùng - Cách dùng: Bôi một lớp mỏng trên vùng da bị bệnh, ngày 3 -4 lần.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Promethazin hydroclorid có tác dụng an thần nhẹ. Tuy nhiên, khi chỉ dùng ngoài da thuốc không ảnh hưởng tới khả năng lái xe hoặc vận hành máy móc.

Thận trọng: Chỉ sử dụng ngoài da, không bôi vào mắt và các niêm mạc, nếu có hiện tượng không dung nạp tại chỗ, phải ngừng điều trị. Thận trọng khi sử dụng cho trẻ dưới 2 tuổi, phụ nữ có thai, cho con bú.

Tương tác với các thuốc khác: Với dạng dùng ngoài da promethazin không có tương tác đáng kể nào với thuốc khác

Quá liều và xử trí : Chưa có báo cáo về trường hợp quá liều.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất .

Bảo quản : Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

Tiêu chuẩn chất lượng : TCCS

Trình bày : Tuyp 5g, 10g. Hộp 1 tuyp.

Chú ý: - Không dùng quá liều chỉ định.

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

- Để xa tầm tay trẻ em. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sỹ.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VITYT HẢI DƯƠNG

102 Chi Lăng TP Hải Dương

ĐT/ Fax : 0320.853848



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng