

Racedagim® 10, 30, 100mg

Racecadotril



Điều trị triệu chứng tiêu chảy cấp tính



⊙ Không gây chóng bụng

Thành phần:

- Mỗi gói 10mg chứa:
Racecadotril10mg
Tá dược vđ1 gói.
- Mỗi gói 30mg chứa:
Racecadotril30mg
Tá dược vđ1 gói.
- Mỗi viên nang chứa:
Racecadotril100mg
Tá dược vđ1 viên.
- Mỗi viên nén chứa:
Racecadotril100mg
Tá dược vđ1 viên.

Dạng bào chế: Thuốc gói, viên nang, viên nén bao phim.

Chỉ định:

* Racedagim 10:

Điều trị triệu chứng tiêu chảy cấp tính trẻ em.

* Racedagim 30:

Điều trị triệu chứng tiêu chảy cấp tính trẻ em và người lớn.

* Racedagim 100 (viên nang - viên nén):

Thuốc chống tiết đường ruột thực thụ dùng điều trị tiêu chảy cấp tính ở người lớn.

Liều dùng và cách dùng:

- Gói 10mg:

Trẻ 3-9 tháng tuổi (dưới 9kg): 1 gói/ lần.
Trẻ 10-30 tháng tuổi (9 - 13 kg): 2 gói/ lần.
Uống lần đầu tiên điều trị và 3 lần tiếp theo trong ngày, những ngày sau uống 3 lần/ ngày, không dùng quá 7 ngày.
Hòa thuốc với 1 lít nước hoặc sữa, khuấy đều và dùng ngay.

- Gói 30mg:

Từ 30 tháng - 9 tuổi (13 - 27 kg): 1 gói/ lần.
Từ 9 tuổi (trên 27 kg): 2 gói/ lần.
Uống lần đầu tiên điều trị và 3 lần tiếp theo trong

ngày, những ngày sau uống 3 lần/ ngày, không dùng quá 7 ngày.

Hòa thuốc với 1 lít nước hoặc sữa, khuấy đều và dùng ngay.

- Viên nang, viên nén 100mg:

Người lớn: Liều khởi đầu 1 viên/ lần và 3 lần tiếp theo trong ngày. Những ngày sau uống 3 lần/ ngày, không dùng quá 7 ngày.

Phối hợp với liệu pháp bù nước và điện giải. Nếu triệu chứng kéo dài hơn 7 ngày, cần phải tham khảo ý kiến của bác sỹ.

Tác dụng phụ và phản ứng có hại:

- Cảm giác buồn ngủ xuất hiện ở vài trường hợp
- Hiếm gặp: buồn nôn, nôn, táo bón, choáng váng và nhức đầu.
- Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Chống chỉ định:

* Racedagim 10, 30:

- Quá mẫn với racecadotril.
- Suy gan, suy thận.
- Không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

* Racedagim 100:

- Quá mẫn với racecadotril.
- Suy gan, suy thận.
- Trẻ em < 15 tuổi.
- Không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Thận trọng:

Không dung nạp fructose, hội chứng kém hấp thu glucose/ galactose, thiếu hụt men sucrase/ isomaltase.

Tác dụng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

Vì thuốc gây buồn ngủ, choáng váng, nhức đầu nên ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy.

Sản xuất tại: CTY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang.
Nhà máy: K. Thanh An, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang.
ĐT: 076.3857300 - 3856966 Fax: 076.3857301

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
24 Đường số 3, Cư Xá Bình Thới, P.8, Q.11, TP. HCM
ĐT: 08.39624777 - 39624888 Fax: 08.39624999
Email: agimexpharmcnhcm@gmail.com

Trang 2

TP Long Xuyên, ngày 30 tháng 10 năm 2014

TL. GIÁM ĐỐC

PCB. Quản lý chất lượng



ĐS. Phạm Thị Bích Thủy