

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Viên đặt

RECTOCARE



Giới thiệu:

Viên đặt dùng để nhét vào sâu trong hậu môn để trị bệnh trĩ, ít gây kích thích, bảo toàn khu vực bị tổn thương. Viên đặt được đưa trực tiếp vào hậu môn sẽ được phóng thích vào cơ thể dưới tác động của thân nhiệt.

Thành phần:

Prednisolon acetat, lidocain, allantoin, vitamin E acetat

Quy cách đóng gói:

Hộp 2 vỉ x 5 viên.

Chỉ định:

Làm liền các vết thương, vết nứt kẽ.
Cải thiện lưu thông máu, tắc nghẽn.
Ngăn ngừa sự hình thành các búi trĩ, nút kẽ hậu môn.
Mất đi cảm giác đau rất, ngứa ngáy, chảy máu, khó chịu và làm co búi trĩ.
Ức chế đau cục bộ, ngứa, đau rát khi đi vệ sinh.
Ức chế các dây thần kinh gây ra cảm giác đau đớn, làm giảm các mô bị sưng.
Chống viêm, chảy máu, sưng tấy, ngứa.

Chống chỉ định:

Trẻ dưới 15 tuổi.
Phụ nữ mang thai.
Những người dị ứng với thành phần của sản phẩm.

Hướng dẫn sử dụng:

Liều dùng: 1 viên/ngày dùng không quá 10 ngày liên tục.

Cách dùng:

Vệ sinh sạch sẽ vùng hậu môn bằng nước ấm hoặc nước muối loãng. Sau đó lau khô nhẹ nhàng.

Dùng tay đẩy viên đạn theo hướng đi của viên đạn vào sâu trong hậu môn từ 2- 3 cm sao cho tay không chạm đến viên thuốc.

Rửa tay sạch sau khi thao tác.

Lưu ý về sử dụng: Dùng trước khi đi ngủ.

Đối tượng sử dụng: Người lớn, thanh thiếu niên trên 15 tuổi.

Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Chú ý:

- Viên đặt có thể mềm hoặc móp khi bảo quản điều kiện thường, nhưng định hình lại khi bảo quản vào tủ lạnh sau 10 phút.

- Trước khi dùng nên để trong ngăn mát tủ lạnh với nhiệt độ từ 2°C-8°C.
Kiểm tra viên thuốc trước khi dùng phải bảo đảm đủ độ cứng, dễ dàng đưa thuốc vào trực tràng. Bóc thuốc ra phải nhét ngay vào hậu môn vì rời lớp vỏ, thuốc dễ tan nhanh.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Nhà sản xuất:



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình,
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

