



REFRESH LIQUIGEL™

(Natri carboxymethylcellulose 1.0%)

Thuốc nhỏ làm trơn mắt

Thuốc nhỏ làm trơn mắt REFRESH LIQUIGEL™ với công thức giống như chính nước mắt của bạn đem lại cảm giác dễ chịu cho mắt khô, bị kích ứng. REFRESH LIQUIGEL™ chứa một chất bảo quản đặc biệt, dịu, không gây kích ứng mà khi nhỏ vào mắt thì chất này sẽ biến đổi cuối cùng thành những thành phần của nước mắt tự nhiên (natri clorid và nước). Dùng REFRESH LIQUIGEL™ thường xuyên khi cần để làm giảm lâu dài chứng mắt khô, bị kích ứng.

THÀNH PHẦN

Mỗi mL chứa:

Hoạt chất: Natri carboxymethylcellulose 10 mg

Tá dược: Dung dịch 2% phức hợp oxychloro ổn định (PURITE™), natri clorid, kali clorid, canxi clorid dihydrat, magesi clorid hexahydrat, acid boric, natri borat decahydrat, nước tinh khiết.

CHỈ ĐỊNH

Làm giảm tạm thời cảm giác nóng, kích ứng và khó chịu do khô mắt hoặc do tiếp xúc với gió hay ánh nắng. Thuốc có thể được dùng như một chất bảo vệ tránh kích ứng mắt thêm nữa.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Thuốc tra mắt

Nhỏ 1 hoặc 2 giọt vào mắt bệnh khi cần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Chống chỉ định đối với những bệnh nhân quá mẫn cảm với carboxymethylcellulose hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG ĐẶC BIỆT KHI SỬ DỤNG

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Chỉ dùng ngoài. Để tránh nhiễm bẩn hoặc tổn thương mắt có thể có, không được để đầu lọ thuốc chạm vào bất cứ bề mặt nào và tránh tiếp xúc với mắt.

Đậy nắp lại sau khi dùng. Chỉ sử dụng nếu nhãn niêm phong ở hai đầu của hộp thuốc còn nguyên vẹn, rõ ràng và dễ đọc. Không sử dụng nếu bao bì REFRESH LIQUIGEL™ cho thấy bằng chứng về sự già mại. Không dùng nếu dung dịch bị đổi màu hoặc trở nên đục.

Nếu bạn thấy mắt đau, thay đổi thị lực, mắt tiếp tục bị đỏ hoặc bị kích ứng, hoặc nếu tình trạng mắt xấu hơn hay kéo dài quá 72 giờ thì nên ngừng sử dụng và hỏi ý kiến bác sĩ.

CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Không có dữ liệu phòng đặc biệt nào về sử dụng REFRESH LIQUIGEL™ trong khi có thai và đang cho con bú.

SỬ DỤNG Ở TRẺ EM

Độ an toàn và hiệu quả chưa được chứng minh với REFRESH LIQUIGEL™ ở bệnh nhân trẻ em.

SỬ DỤNG Ở NGƯỜI CAO TUỔI

Không quan sát thấy sự khác biệt tổng thể về độ an toàn hoặc hiệu quả giữa bệnh nhân cao tuổi và bệnh nhân người lớn khác.

TÁC ĐỘNG KHI LÁI XE VÀ SỬ DỤNG MÁY MÓC

REFRESH LIQUIGEL™ có thể gây nhìn mờ thoáng qua, điều này có thể làm suy giảm khả năng lái xe hoặc vận hành máy móc. Bệnh nhân nên chờ cho đến khi thị lực rõ trở lại trước khi lái xe hoặc vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC

Chưa được ghi nhận

TÁC DỤNG PHỤ

Khi dùng theo chỉ dẫn thì không có tác dụng phụ nào đáng kể. Tình thoảng có báo cáo về kích ứng mắt và phản ứng dị ứng.

Tóm tắt các phản ứng phụ của thuốc trong các nghiên cứu lâm sàng:

Tiết dịch mắt, kích ứng mắt, nóng rát và khó chịu, ngứa mắt, sung huyết kết mạc mí mắt, rối loạn thị giác.

Kinh nghiệm hậu mãi:

Rối loạn mắt

Đau mắt, đóng vảy ở rìa mí mắt và/hoặc phần thuốc còn lại ở rìa mí mắt, cảm giác có dị vật trong mắt, sung huyết mắt

Rối loạn hệ miễn dịch

Quá mẫn bao gồm dị ứng mắt.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU

Không có hại cho mắt khi sử dụng quá liều.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

REFRESH LIQUIGEL™ được đựng trong lọ polyethylene tỷ trọng thấp, có đầu nhỏ giọt và nắp đậy bằng polystyrene. Hộp 1 lọ x 15 mL.

BẢO QUẢN

Bảo quản dưới 25°C.

Chỉ sử dụng nếu nhãn niêm phong ở đầu hộp thuốc còn nguyên vẹn.

Không dùng quá 30 ngày sau khi mở.

Để thuốc xa tầm tay của trẻ em.

Không dùng thuốc quá hạn sử dụng ghi trên bao bì.

HẠN DÙNG

24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Nhà sản xuất:

Allergan Sales, LLC

Waco, TX 76712, USA

© 2015 Allergan, Inc.

Các nhãn hiệu ® và ™ thuộc sở hữu của Allergan, Inc.

Ngày sửa đổi: Tháng 3 năm 2014