

REMINT - S FORT

Viên nén nhai

THÀNH PHẦN:	1 viên
Gel Nhôm hydroxyd khô.....	400 mg
Magnesi hydroxyd	400 mg
Tá dược	vừa đủ

(Tá dược gồm: Tinh bột ngô 100 mg, Mannitol 200 mg, Saccharin sodium 1,2 mg, PVP 20 mg, Hương bạc hà 11,21 mg, Magnesi stearat 11,21 mg, Aerosil 2,24 mg)

DẠNG TRÌNH BÀY: Hộp 1 chai x 100 viên nén nhai

CHÚ Ý: - ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
- NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ.

DƯỢC LỰC HỌC:

- Gel nhôm hydroxyd: làm trung hoà acid của dịch vị.
- Magnesi hydroxyd: làm trung hoà acid của dịch vị.
- Kết hợp với Magnesi hydroxyd làm nâng pH của dịch vị nhanh hơn đồng thời làm giảm tác dụng tiêu hóa của Gel nhôm hydroxyd.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

- Nhôm hydroxyd: Nhôm hydroxyd tan chậm trong dạ dày và phản ứng với acid hydrochloric tạo thành nhôm clorid và nước. Khoảng 17 - 30% nhôm clorid tạo thành được hấp thu và thải trừ nhanh qua nước tiểu ở người có chức năng thận bình thường. Ở ruột non nhôm clorid chuyển thành muối nhôm kiềm không tan và kém hấp thu. Một lượng nhôm khác phối hợp với phosphat tạo thành nhôm phosphat không tan trong ruột và được thải trừ theo phân.

- Magnesi hydroxyd: magnesi hydroxyd tan chậm trong dạ dày và phản ứng với acid hydrochloric tạo thành magnesi clorid và nước. Khoảng 15 - 30% magnesi clorid tạo thành được hấp thu và sau đó được thải trừ qua nước tiểu ở người có chức năng thận bình thường. Lượng magnesi hydroxyd chưa chuyển hoá có thể chuyển hoá ở ruột non thì hấp thu không đáng kể.

CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị các triệu chứng đau dạ dày do tăng tiết acid.
- Viêm loét dạ dày và tá tràng.

LIỀU DÙNG: Theo chỉ định của thầy thuốc.

- Liều thông thường cho người lớn: 2 - 4 viên/lần.
- Nhai viên thuốc sau bữa ăn 1 - 3 giờ và khi đi ngủ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với nhôm hydroxyd hoặc với magnesi hydroxyd.
- Suy thận nặng.

THẬN TRỌNG:

Sử dụng thận trọng với người có suy tim xung huyết, suy thận, phù, xơ gan và chế độ ăn ít natri và với người mới bị chảy máu đường tiêu hóa.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

- Phụ nữ có thai: Thuốc được xem là an toàn đối với phụ nữ có thai nhưng nên tránh dùng liều cao và kéo dài.

- Phụ nữ cho con bú: Mặc dù có 1 lượng nhỏ nhôm và magnesi bài tiết qua sữa nhưng không đủ gây tác hại cho trẻ đang bú. Thuốc sử dụng được cho phụ nữ cho con bú.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Thuốc không có tác động không mong muốn lên hệ thần kinh trung ương nên sử dụng được cho người lái xe và vận hành máy móc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

- Giảm phosphat máu khi dùng thuốc kéo dài hoặc liều cao.
- Chát miệng, buồn nôn.
- Ngộ độc nhôm và nhuyễn xương có thể xảy ra ở người bệnh có hội chứng urê máu cao.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

- Các thuốc kháng acid đều làm tăng hoặc giảm tốc độ và mức độ hấp thu các thuốc khác khi dùng phối hợp hoặc do làm thay đổi thời gian thuốc trong ống tiêu hóa hoặc do có sự gắn kết với chúng.

- Dùng đồng thời với:

+ Tetracyclin, Ofloxacin, Norfloxacin, Digoxin, Indomethacin, các muối sắt: thuốc kháng acid làm giảm hấp thu những thuốc này.

+ Amphetamin, Quinidin: thuốc Remint-S làm tăng tác dụng các thuốc này do chúng bị giảm thải trừ.

Lưu ý: Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUẢ LIỀU VÀ XỬ TRÍ:

- Triệu chứng: Chát miệng, ỉa chảy.
- Xử trí: + Gây nôn hoặc rửa dạ dày.
- + Điều trị hỗ trợ: Bổ sung nước và muối khoáng.

BẢO QUẢN - HẠN DÙNG:

Bảo quản: Dưới 30°C, nơi khô mát, tránh ánh sáng.

ĐỂ THUỐC XA TẮM TAY TRẺ EM.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn: ĐVN IV.



Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA
Đường 2-4 P.Vinh Hòa - TP Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Nha Trang, ngày 28 tháng 12 năm 2012.
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA
 TỔNG GIÁM ĐỐC *Nguyễn Việt Hùng*
 PHÓ CHỦNG TRƯỞNG
ĐS. Lê Nhuận

