

Hướng dẫn sử dụng

RETASOL

Giới thiệu:

GEL DỪNG ĐƯỜNG TRỰC TRÀNG RETASOL chứa 50% sorbitol và 7,2% natri citrat giúp làm giảm tình trạng táo bón, làm trơn và mềm phân giúp tổng phân, hơi ra ngoài dễ dàng, kích thích cơ trơn và làm tăng nhu động ruột.

Thành phần:

Sorbitol 50 %, natri citrat 7,2 %, natri lauryl sulfat, natri methyl hydroxybenzoat, natri propyl hydroxybenzoat, carboxy methyl cellulose natri, nước tinh khiết.

Dạng bào chế: Gel dùng đường trực tràng.

Quy cách đóng gói:

1 tuýp/túi nylon x 6 túi nylon/hộp

Chỉ định:

Giúp làm giảm tình trạng táo bón do các nguyên nhân ở vùng trực tràng và hậu môn.

Chuẩn bị nội soi trực tràng.

Đối tượng không sử dụng:

Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm

Liều dùng và hướng dẫn sử dụng:

Liều dùng: 1 tuýp/ngày. Dùng trước thời điểm dự định đi đại tiện 5 - 20 phút.

Hướng dẫn sử dụng: Mở nắp tuýp. Bóp nhẹ tuýp để 1 ít gel bôi trơn đầu ống dẫn. Đưa toàn bộ ống dẫn vào trực tràng, bóp đẩy hết gel trong ống vào trực tràng. Rút ống dẫn ra, trong khi rút vẫn bóp giữ ống.

Thận trọng và cảnh báo:

Tránh dùng sản phẩm trong đợt cấp của trĩ, rò hậu môn hay viêm đại tràng xung huyết

Nếu sau khi dùng sản phẩm có kích ứng hoặc có phản ứng quá mẫn, cần ngừng dùng sản phẩm.

Bảo quản:

Nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

Hạn dùng:

36 tháng kể từ ngày sản xuất

Nhà sản xuất:



Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình,
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

T2-19-080823-T03099-060001