


Lần đầu: 27/12/2013

203/84



MẪU VỈ THUỐC



KOREA E-PHARM INC.

K. U. Soh

President

R_x – Thuốc bán theo đơn

**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em**

Viên nang REVIVE

[Thành phần]

Mỗi viên nang cứng chứa:

Hoạt chất

L-ornithin -L-aspartat150 mg

Tá dược:

Lactose, Tinh bột bắp (Corn starch), Magnesium stearat, Gelatin, Glycerin, Ethyl vanilin

Titan dioxit, Màu xanh số 1 (Food Blue No 1), Màu vàng số 5 (Food yellow No 5), Màu đỏ số 40 (Food Red No 40), Nước tinh khiết.

[Dược lực học]

L-Ornithin-L-Aspartat là sự kết hợp hai amino acid quan trọng trong chu trình chuyển hóa gan. Tăng khả năng khử độc của gan, cải thiện cân bằng năng lượng. Tác dụng tốt trong suy chức năng gan, thúc đẩy tái tạo tế bào gan.

L-Ornithin: L-Ornithin hoạt động như một chất hoạt hóa ornithine-carbamyl transferase và carbamyl phosphate synthetase. L-Ornithine là chất tác động lên chu trình tổng hợp ure nhờ vào sự bài tiết amonia từ máu.

L-Aspartat: L-Aspartat tác động lên chu trình Acid Citric. L-Aspartat đóng vai trò tác nhân kích thích sinh tổng hợp Glutamine nhờ tế bào thực bào mạch máu ngoại biên, sự thiếu hụt chất này có khả năng gây nên bệnh gan cấp tính và mãn tính. L-Aspartat cải thiện năng lượng của tế bào gan nhờ vào việc kích thích sinh năng lượng tại các tế bào tổn thương tại gan như hoạt hóa các tế bào bất hoạt, sản sinh ra những tế bào mới.

L-Ornithin-L-Aspartat: được hấp thu từ ruột non thông qua mép vi nhung mao của biểu mao ruột.

[Dược động học]

L-Ornithin - L-Aspartat được hấp thu nhanh sau khi uống, khi vào cơ thể tách thành L-Ornithin và L-Aspartat. Chu kỳ bán hủy của mỗi amino acid ngắn, trong khoảng 40 phút. Đôi khi L-Aspartat cũng được tìm thấy dưới dạng chưa biến đổi trong nước tiểu. Sinh khả dụng đạt được $82,2 \pm 28\%$ sau khi uống. Chúng được bài tiết qua nước tiểu và phân.

[Chỉ định]

- Điều trị chứng tăng ammoniac huyết liên quan đến bệnh lý gan cấp và mãn tính (xơ gan, gan nhiễm mỡ, viêm gan.
- Điều trị rối loạn ý thức trong giai đoạn tiền hôn mê gan.

[Liều lượng và cách dùng]

Trừ khi có sự kê toa khác, dùng liều từ 1-3 viên/lần, 3 lần mỗi ngày sau bữa ăn trong 1-2 tuần. Sau đó dùng 1 viên/lần, 3 lần mỗi ngày trong 4-5 tuần. Thời gian điều trị tùy thuộc vào tình trạng bệnh.

Cảnh báo

Sử dụng liều cao L-Ornithin - L-Aspartat cần theo dõi nồng độ urea trong huyết thanh và nước tiểu.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh nhân suy thận nặng (creatinin huyết thanh $> 3\text{mg}/100\text{ml}$)
Bệnh nhân mẫn cảm với thành phần của thuốc.



LƯU Ý VÀ THẬN TRỌNG

- Trong trường hợp mẫn cảm với các thành phần của thuốc nên ngừng dùng thuốc và hỏi ý kiến bác sĩ, dược sĩ.
- Trẻ em dùng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ và dưới sự giám sát của người lớn.
- Không dùng thuốc quá liều.
- Trong trường hợp bệnh nhân bị suy gan nặng, nên dùng liều thấp hơn(ví dụ ½ liều).
- Uống thuốc với một ít nước.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Do hiệu quả và an toàn của thuốc ở phụ nữ có thai và cho con bú chưa được thử nghiệm lâm sàng nên chỉ dùng thuốc khi thật sự cần thiết và có sự kê đơn của bác sĩ.

Không có nghiên cứu về bài tiết của thuốc qua sữa mẹ, do đó cần phân tích kỹ lợi ích của việc dùng thuốc và tác hại có thể xảy ra với trẻ nếu bắt buộc phải dùng thuốc nên tạm dừng việc cho con bú.

Tác động của thuốc đến khả năng lái xe và vận hành máy móc: L- Ornithin - L-Aspartat không làm ảnh hưởng đến khả năng vận hành máy móc và lái xe.

Tác dụng phụ

L-Ornithin L-Aspartat có đặc tính an toàn cao và cho đến nay chưa thấy có tác dụng phụ. Tuy nhiên trong trường hợp thấy buồn nôn và nôn, tiêu chảy và ngứa do dùng thuốc nên ngừng dùng thuốc và nên hỏi ý kiến bác sĩ và dược sĩ.

Trong trường hợp bị rối loạn dạ dày hay táo bón do dùng thuốc, nên ngừng sử dụng thuốc và hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

Thông báo cho bác sĩ nếu có bất cứ phản ứng phụ nào xảy ra khi dùng thuốc
Nếu cần biết thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của thầy thuốc.

Tương tác thuốc

Chưa có báo cáo về sự tương tác của L - Ornithin - L - Aspartat với các thuốc khác

Quá liều

Chưa có thông tin về trường hợp quá liều.

Đóng gói 10 viên/vi x 10 vi/gói nhôm/hộp.

Dạng bào chế: Viên nang cứng.

Đường dùng: Đường uống.

Hạn dùng 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ dưới 30°C

Tiêu chuẩn Nhà sản xuất

Nhà sản xuất
KOREA E PHARM INC
648-2 CHOJIDONG, ANSANSI, KYUNGKI - DO, HÀN QUỐC.



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh