

Thuốc kháng viêm – giảm đau không steroid
SHINPOONG ROSIDEN® Gel
(Piroxicam)

THÀNH PHẦN: Mỗi tuyp 20 gram gel chứa

Hoạt chất: Piroxicam 100mg

Tá dược: carbomer 940, hydroxypropyl cellulose (H), propylen glycol, dung dịch D-Sorbitol 70%, triethanolamin, L-menthol, ethanol, benzyl alcohol, polysorbat 20, nước tinh khiết.

TRÌNH BÀY: Hộp 1 tuyp 20g.

CHỈ ĐỊNH

Giảm đau và kháng viêm trong các bệnh sau:

- Viêm khớp dạng thấp và viêm xương khớp, thoái hóa khớp.
- Viêm cột sống dính khớp, bệnh cơ xương cấp và chấn thương thể thao.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG:

- Dùng ngoài da.
- Bôi thuốc lên chỗ tổn thương và xoa nhẹ 3-4 lần/ngày với lượng tương ứng 15-20 mg piroxicam/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Quá mẫn với Piroxicam và các thành phần khác của thuốc.
- Người có tiền sử bị cơ thắt phế quản, hen, polyp mũi và phù Quincke hoặc mày đay do aspirin, hoặc một thuốc chống viêm không steroid khác gây ra.

THẬN TRỌNG

- Nếu có phản ứng da tại chỗ phải ngưng thuốc ngay và chuyển sang chế độ điều trị cần thiết khác.
- Không bôi lên mắt, niêm mạc, vết thương hở.
- Không dùng thuốc dưới dạng băng đắp.

SỬ DỤNG Ở PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Mặc dù không có tác động sinh quái thai của piroxicam dùng đường uống khi thử nghiệm trên động vật nhưng tình an toàn trong thời kỳ mang thai và cho con bú chưa được xác định. Không nên sử dụng piroxicam cho phụ nữ có thai và cho con bú.

TÁC ĐỘNG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Không ảnh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Chưa có tài liệu nghiên cứu tương tác thuốc khi dùng ngoài da.

TÁC DỤNG PHỤ

Hiếm gặp các phản ứng dị ứng tại chỗ: ngứa, đỏ da, ban, da tróc vảy.

Thông báo cho bác sĩ các tác dụng phụ gặp phải khi dùng thuốc.

ĐƯỢC LỰC HỌC

Piroxicam là thuốc chống viêm không steroid, thuộc nhóm oxicam, thuốc có tác dụng chống viêm, giảm đau và hạ sốt. Cơ chế tác dụng của thuốc chưa được rõ. Tuy nhiên cơ chế chung cho các tác dụng nêu trên có thể do ức chế prostaglandin synthetase và do đó ngăn ngừa sự tạo thành prostaglandin, thromboxan, và các sản phẩm khác của enzym cyclooxygenase. Piroxicam còn có thể ức chế hoạt hóa của các bạch cầu đa nhân trung tính, ngay cả khi có các sản phẩm của cyclooxygenase, cho nên tác dụng chống viêm còn gồm cơ chế proteoglycanase và collagenase trong sụn.

ĐƯỢC ĐỘNG HỌC

- Sau khi bôi liều duy nhất tương ứng 15 mg piroxicam dính hấp thu trong huyết tương trung bình là 147 ng/ml.
- Sau khi bôi 1 g gel, 2 lần/ngày (tương ứng với liều hàng ngày là 20 mg piroxicam), các nồng độ trong huyết tương ở tình trạng cân bằng đạt được từ 300 đến 400 ng/ml.
- Thời gian bán hủy trong huyết tương khoảng 50 giờ.

QUÁ LIỀU:

Chưa có quá liều xảy ra đối với dạng gel dùng ngoài da.

BẢO QUẢN: Bảo quản trong bao bì kín, nơi khô-tránh ánh sáng, ở nhiệt độ dưới 30°C.

HẠN SỬ DỤNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN: TCCS

KHUYẾN CÁO:

- Tránh xa tầm tay trẻ em
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.



SHINPOONG DAEWOO
CTY TNHH DP SHINPOONG DAEWOO

Nhà máy: Số 13, Đường 9A KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai, Việt Nam

Văn phòng: Phòng 05-07, Lầu 9, Tòa nhà Everrich 1

Số 988 Đường 3-2, Phường 15, Quận 11, TP: HCM

ĐT: (08) 22250683/84/85/86/87/88 Fax: (08) 22250682

Website: www.shinpoong.com.vn Email: shinpoong@spd.com.vn

Bộ phận chăm sóc khách hàng: DS, Anh / Phòng NC-PT - Số nội bộ: 109