

Viên bao đường

CÔNG THỨC:

Rutin khan..... 50mg
Vitamin C (acid Ascorbic)..... 50mg
Tá dược vừa đủ..... 1 viên
(Lactose, Magnesium stearate, Tinh bột sắn, đường RE, Talc, gôm Arabic, Methyl hydroxybenzoate, Propyl hydroxybenzoate, gôm Lacque, Ethanol 96%, dầu Thầu dầu, màu Sunset yellow, màu Erythrosine, Sáp ong, Paraffin).

TÍNH CHẤT:

- Rutin là một flavonoid thuộc nhóm Euflavonoid, có tác dụng làm bền và giảm tính thấm của mao mạch, tăng độ bền của hồng cầu, hạ thấp trương lực cơ và chống co thắt.
- Vitamin C là một vitamin tan trong nước, có liên quan đến sự hình thành collagen và thay thế mô.
- Sự kết hợp giữa Rutin và Vitamin C sẽ cho tác dụng được lý tốt hơn khi chỉ dùng Rutin riêng lẻ.

CHỈ ĐỊNH:

Hỗ trợ điều trị các hội chứng chảy máu, xơ cứng mạch máu, tăng huyết áp, ban xuất huyết, chứng giãn tĩnh mạch (phù, đau, nặng chân, bệnh trĩ,...). Tác dụng làm tăng sức bền thành mạch và giảm tính thấm mao mạch.

CÁCH DÙNG:

- Ngày uống 2 - 3 lần trong bữa ăn:
- Người lớn: 1 - 2 viên/lần.
 - Trẻ em: 1 viên/lần.

Uống thuốc liên tục trong 1 tháng. Khi cần có thể nhắc lại, nếu không có chỉ định khác.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

TÁC DỤNG PHỤ:

- Một số trường hợp xảy ra đau đầu, buồn nôn, tiêu chảy,... Có thể làm tăng xuất huyết ở người thiếu men G-6-PD.
- Rất hiếm xảy ra phản ứng dị ứng.
- Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

THẬN TRỌNG:

Thận trọng khi dùng chung các thuốc khác có chứa Vitamin C.

THỜI KỲ MANG THAI - CHO CON BÚ:

Vitamin C đi qua nhau thai và phân bố trong sữa mẹ, thận trọng khi sử dụng cho phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

- Dùng đồng thời Vitamin C với Aspirin làm tăng bài tiết Vitamin C và giảm bài tiết Aspirin trong nước tiểu.
- Dùng đồng thời Vitamin C và Fluphenazine dẫn đến giảm nồng độ Fluphenazine huyết tương.
- Vitamin C liều cao có thể phá hủy Vitamin B₁₂.
- Vitamin C ảnh hưởng đến nhiều xét nghiệm dựa trên phản ứng oxy hóa-khử.

QUÁ LIỀU:

Nếu trường hợp quá liều xảy ra, đề nghị đến ngay cơ sở y tế gần nhất để nhân viên y tế có phương pháp xử lý.

HẠN DÙNG:

- 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không sử dụng thuốc hết hạn dùng.

BẢO QUẢN:

Nơi khô (độ ẩm ≤ 70%), nhiệt độ ≤ 30°C, tránh ánh sáng.

TRÌNH BÀY:

Vỉ 10 viên bao đường. Hộp 10 vỉ.

Sản xuất theo TCCS

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

297/5 Lý Thường Kiệt - Quận 11 - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam