

27/139

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

**MẪU NHÃN DUYỆT CẤP SỐ ĐĂNG KÝ
RUTIN VITAMIN C - HT**

HÀ TĨNH - 2012

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh
ĐT : 0393854617 - Fax 0393856821

MẪU NHÃN VỈ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ĐÃ PHÊ DUYỆT	
RUTIN VITAMIN C - HT Rutin..... 50mg Acid Ascorbic..... 50mg Công ty CP Dược Hà Tĩnh HADIPHAR SDK:	RUTIN VITAMIN C - HT Rutin..... 50mg Acid Ascorbic..... 50mg Công ty CP Dược Hà Tĩnh HADIPHAR SDK:
Lần đầu: 1 / 4 / 2015	
Số lô SX: HO:	
CÔNG THỨC CHO 1 VIÊN: Rutin..... 50mg Acid Ascorbic..... 50mg Tà dược vừa đủ 1 viên Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng - Cách dùng: Xem tờ hướng dẫn bên trong hộp. Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C tránh ánh sáng Tiêu chuẩn áp dụng: ĐVNIV SDK:	
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh Tel: 039 3855906*Fax: 039 3856821	
NSX: Số lô SX: HD:	
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao đường	
RUTIN VITAMIN C - HT Rutin.....50mg Acid Ascorbic50mg	
HADIPHAR	
CÔNG THỨC CHO 1 VIÊN: Rutin..... 50mg Acid Ascorbic..... 50mg Tà dược vừa đủ 1 viên Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng - Cách dùng: Xem tờ hướng dẫn bên trong hộp. Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C tránh ánh sáng Tiêu chuẩn : ĐVNIV	
HATINH PHARMACEUTICAL J.S.C 167 Ha Huy Tap St, Ha Tinh City Tel: 039 3855906*Fax: 039 3856821	
HADIPHAR	
RUTIN VITAMIN C - HT Rutin.....50mg Acid Ascorbic50mg	
HADIPHAR	
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao đường	

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh
ĐT : 0393854617 - Fax 0393856821


MẪU NHÃN VÌ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ



Công thức cho 1 viên:
Rutin..... 50mg
Acid Ascorbic..... 50mg
Tá dược vừa đủ 1 viên
Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng - Cách dùng:
Xem tờ hướng dẫn bên trong hộp.
Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C tránh ánh sáng
Tiêu chuẩn





CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
Tel: 039 3855906*Fax: 039 3856821

NSX:
Số lô SX:
HD:



UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh
ĐT : 0393854617 - Fax 0393856821

MẪU NHÃN LỘ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

RUTIN VITAMIN C - HT

Công thức bào chế cho : 1 viên

Acid ascorbic	50,0 mg
Rutin	50,0 mg

Tá dược: Tinh bột mỳ, PVP, Talc, Magnesi stearat, Titan dioxyd, Màu Sunset yellow
Đường trắng, Parafin, Nước tinh khiết vừa đủ 1 viên

Chỉ định điều trị: Hỗ trợ điều trị hội chứng chảy máu do kém vững bền thành mạch, xơ cứng, tăng huyết áp, ban xuất huyết, chứng giãn tim mạch (phù, đau, nặng chân, bệnh trĩ...)

Liều lượng và cách dùng: Ngày uống từ 2-3 lần

- Người lớn: 2- 3 viên/lần

- Trẻ em: 1 viên/lần

Chống chỉ định: Không dùng cho người bị thiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase (G6PD) (nguy cơ thiếu máu huyết tán), người có tiền sử sỏi thận, tăng oxalat niệu và loạn chuyển hoá oxalat (tăng nguy cơ sỏi thận), bị bệnh thalassemia (tăng nguy cơ hấp thu sắt).
- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

- Không được dùng cho trường hợp nghẽn mạch và máu có độ đông cao.

Tác dụng không mong muốn: Tăng Oxalat niệu, buồn nôn, ợ nóng, co cứng cơ bụng, mệt mỏi, đỏ bừng, nhức đầu, mất ngủ và tình trạng mất ngủ đã xảy ra. Nếu dùng liều 1g Vitamin C hàng ngày có thể xảy ra ỉa chảy.

- Một số trường hợp xảy ra rối loạn tiêu hóa và rối loạn thần kinh thực vật nhẹ, không cần phải ngưng điều trị.

Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Tương tác với các thuốc khác, các dạng tương tác khác: Dùng đồng thời theo tỷ lệ trên 200mg vitamin C với 30mg sắt nguyên tố làm tăng hấp thu sắt qua đường dạ dày - ruột; tuy vậy, đa số người bệnh đều có khả năng hấp thu sắt uống vào một cách đầy đủ mà không phải dùng đồng thời vitamin C.

Dùng đồng thời vitamin C với aspirin làm tăng bài tiết vitamin C và giảm bài tiết aspirin trong nước tiểu.

Dùng đồng thời vitamin C với fluphenazin dẫn đến giảm nồng độ fluphenazin huyết tương. sự acid - hoá nước tiểu sau khi dùng vitamin C có thể làm thay đổi sự bài tiết của các thuốc khác.

Vitamin C liều cao có thể phá huỷ vitamin B₁₂; cần khuyến người bệnh tránh uống vitamin C liều cao trong vòng 1 giờ trước hoặc sau khi uống vitamin B₁₂.

Những lưu ý đặc biệt và cảnh báo khi dùng thuốc: Thận trọng khi sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú vì dùng lượng lớn Vitamin C trong thời kì mang thai và cho con bú có thể làm tăng nhu cầu về Vitamin C và dẫn đến bệnh Scorbut ở trẻ sơ sinh.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Thận trọng khi sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú

Tác dụng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Chưa có thông tin



Sử dụng quá liều: Những triệu chứng quá liều gồm sỏi thận, buồn nôn, viêm dạ dày và ỉa chảy. Gây lợi tiểu bằng truyền dịch có thể có tác dụng sau khi uống liều lớn.

Qui cách đóng gói: Ép vỉ 10 viên hộp 10 vỉ, hộp 5 vỉ. Lọ 100 viên/hộp..

Bảo quản: Nơi khô mát nhiệt độ dưới 30⁰C tránh ánh sáng

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn áp dụng: ĐDVN IV

**ĐỂ THUỐC XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SỸ.**



HADIPHAR

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

167 - Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh

ĐT: 0393 854617 - 3 855906 Fax : 3856821



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh

