

**Rx** THUỐC BÁN THEO ĐƠN

**TRƯỜNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**

**ĐỂ XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM**

**THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SĨ**

**NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN THẦY THUỐC ĐIỀU TRỊ**

*Viên nén*

# Salbutamol 2mg

**TRÌNH BÀY:** Hộp 10 vỉ x 10 viên nén

**CÔNG THỨC :**

Salbutamol sulfat tương đương Salbutamol base.....2mg

Latose, Eragel, Magnesi stearat, Erythrocin lake.....vỡ 1 viên nén

**CÁC ĐẶC TÍNH TÁC DỤNG:**

*Các đặc tính dược lực học:*

Salbutamol là một chất kích thích - adrenergic có tác động chọn lọc lên thụ thể trên cơ phế quản ( làm giãn cơ trơn phế quản) và có rất ít hay không có tác động lên các thụ thể ở tim với liều điều trị.

*Các đặc tính dược động học:*

Hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa, phân bố trong cơ thể, trừ ở phế nang. Chuyển hóa lần đầu qua gan. Khoảng 1/2 thải trừ qua nước tiểu dưới dạng đã chuyển hóa.

**CHỈ ĐỊNH:**

Gây giãn phế quản, điều trị và phòng ngừa cơn co thắt phế quản do hen phế quản, viêm phế quản mãn và các rối loạn phế quản- phổi mãn tính khác.

**LIỀU LƯỢNG - CÁCH DÙNG:**

- Người lớn và trẻ em > 12 tuổi: 2-4 mg/lần x 3-4 lần/ ngày.

- Người già: 2 mg/ lần x 3-4 lần/ ngày.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**

Quá mẫn cảm với thuốc. Loạn nhịp nhanh, nhồi máu cơ tim. Cơn co thắt phế quản cấp, basedow. Trẻ em dưới 6 tuổi, phụ nữ có nguy cơ xảy thai.

**TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC:**

Tránh dùng kết hợp với các thuốc chủ vận beta không chọn lọc.

Không nên dùng kết hợp salbutamol dạng uống với các thuốc chẹn beta (như propranolol).

Cần thận trọng khi người bệnh có dùng thuốc chống đái tháo đường. Phải theo dõi máu và nước tiểu vì salbutamol có khả năng làm tăng đường huyết. Có thể chuyển sang dùng insulin.

Khi chỉ định salbutamol cần phải giảm liều thuốc kích thích beta khác nếu đang dùng thuốc đó để điều trị.



**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:**

Thường gặp, ADR < 1/100:

Tuần hoàn: đánh trống ngực, nhịp tim nhanh.

Thần kinh: Run đầu ngón tay.

Hiếm gặp, ADR < 1/1000:

Hô hấp: Co thắt phế quản, khô miệng, họng bị kích thích, ho và khản tiếng.

Chuyển hóa: hạ kali huyết.

Cơ xương: Chuột rút.

Thần kinh: Dễ bị kích thích, nhức đầu.

Phản ứng quá mẫn: Phù, nổi mào đay, hạ huyết áp, trụy mạch

Salbutamol có thể gây dễ gây run cơ, chủ yếu ở các đầu chi, hồi hộp, nhịp xoang nhanh. Tác dụng này ít thấy ở trẻ em. Đã thấy có các rối loạn tiêu hóa (buồn nôn, nôn) khi dùng salbutamol đường uống.

*Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.*

**SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:**

*Phụ nữ có thai:*

Salbutamol đã được chứng minh gây quái thai ở chuột khi tiêm dưới da với liều tương ứng gấp 14 lần liều khí dung ở người. Chưa có công trình nghiên cứu quy mô nào ở người mang thai. Tuy vậy khi dùng cần thận trọng cân nhắc lợi hại.

*Phụ nữ cho con bú:*

Hiện nay chưa biết salbutamol có tiết vào sữa mẹ không, nhưng vì khả năng gây quái thai ở một số súc vật, nên cần thận trọng khi dùng thuốc cho người mẹ cho con bú.

**TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE HOẶC VẬN HÀNH MÁY MÓC:**

Chưa được ghi nhận.

**QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ:**

Mọi dấu hiệu quá liều đều có thể đối phó bằng cách ngừng thuốc, tuy nhiên nên cẩn thận khi dùng thuốc chẹn  $\beta$  đối với bệnh nhân có tiền sử co thắt phế quản.

**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất

*Không dùng quá thời hạn ghi trên bao bì.*

**BẢO QUẢN:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

**TIÊU CHUẨN:** TCCS



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**

9 Trần Thành Tông - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội - Việt Nam

Sản xuất tại:

L5 27, KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội - Việt Nam

ĐT: 04.20474126

