

Traphaco®

HSDK thuốc SAMACA 2017 sản xuất tại Traphaco HY

Tờ hướng dẫn sử dụng



Thuốc nhỏ mắt
SAMACA

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 lọ 5 ml

DẠNG BÀO CHÉ: Dung dịch nhỏ mắt

Mô tả: dung dịch trong, không màu đến màu ngà vàng.

THÀNH PHẦN: mỗi lọ 5 ml chứa:

Thành phần hoạt chất:

Natri hyaluronat 5 mg

Thành phần tá dược:

Dinatri edetat, Natri clorid, Kali clorid, Kolliphor vừa đủ
RH40, Natri dihydrophosphat, Dinatri hydrophosphat, Benzalkonium clorid, Nước cất

ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC, DƯỢC ĐỘNG HỌC:

DƯỢC LỰC HỌC:

Natri hyaluronat kết hợp với fibronectin và thúc đẩy sự dính và giãn tế bào biểu mô.

Natri hyaluronat cũng có đặc tính giữ nước rất tốt vì mỗi phân tử natri hyaluronat có thể giữ nhiều phân tử nước.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Natri hyaluronat được hấp thu với lượng rất nhỏ khi dùng qua đường nhỏ mắt.

CHỈ ĐỊNH:

Rối loạn biểu mô giác - kết mạc do các bệnh sau:

- Các bệnh nội tại như hội chứng Sjogren, hội chứng Steven - Johnson và hội chứng khô mắt.
- Các bệnh ngoại lai do phẫu thuật, thuốc, chấn thương, mang kính sát tròng...

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

Thông thường, nhỏ vào mắt mỗi lần 1 giọt, 5 - 6 lần/ngày. Liều lượng có thể được điều chỉnh theo triệu chứng của bệnh nhân.

Lưu ý:

- Không dùng chung mỗi lọ cho nhiều người, không chạm vào đầu nhò giọt (kè cá mắt của bạn), đóng chặt nắp lọ ngay sau khi sử dụng để tránh nhiễm khuẩn.

- Lọ thuốc đã mở không dùng quá 15 ngày

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Không dùng nếu bạn có tiền sử quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC:

- Sản phẩm chứa benzalkonium chlorid, có thể gây kích ứng mắt hoặc gây biến màu đổi với kính áp tròng mềm.



Traphaco®

HSDK thuốc SAMACA 2017 sản xuất tại Traphaco HY

- Ngưng dùng thuốc nếu cảm thấy mắt khô chát, đỏ mắt, ngứa mắt, sưng mắt.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

- Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ có thai, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ

- Dùng được cho phụ nữ cho con bú

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Cũng giống như khi nhò mắt bất kỳ thuốc nào khác, nhìn mờ tạm thời hoặc các rối loạn thị giác có thể làm ảnh hưởng đến khả năng lái xe và điều khiển máy móc của bệnh nhân. Nếu bị nhìn mờ sau khi nhò thuốc, bệnh nhân phải chờ đến khi nhìn rõ lại mới được lái xe và điều khiển máy móc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Trừ trường hợp có chỉ định của bác sĩ, tránh dùng cùng lúc với các loại thuốc nhò mắt khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

- Thuốc có thể gây dị ứng như ngứa mắt, đỏ mắt, nhức mắt trong một số trường hợp.
Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc được sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

- Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.
- Trường hợp sử dụng thuốc quá liều, rửa mắt lại bằng nước ấm hoặc nước muối sinh lý ngay lập tức. Trường hợp quá liều nặng, khẩn trương đến các cơ sở y tế.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: - 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

- 15 ngày sau khi mở nắp.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CỦA THUỐC: TCCS

Sản phẩm của: CÔNG TY CÓ PHẦN TRAPHACO

75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội – Tel: (84-24) 36810724/Fax: (84-24) 36811542

Điện thoại liên hệ: 18006612

Sản xuất tại: CÔNG TNHH TRAPHACO HƯNG YÊN

Thôn Bình Lương - Xã Tân Quang - Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên



TUQ CỤC TRƯỞNG
P.TRUỞNG PHÒNG

Nguyễn Thị Khu Khuy