



Tờ hướng dẫn sử dụng

SAMINCAPS

Viên nang

CÔNG THỨC: Mỗi viên nang chứa:

Glucosamin250 mg
(Dạng Glucosamin hydroclorid)

Tá dược: (Lactose, Pregelatinised starch, Tinh bột mì, Sodium starch glycolate, Bột talc, Magnesi stearat) vừa đủ.....1 viên nang.

CHỈ ĐỊNH:

Giảm triệu chứng của viêm khớp gối nhẹ và trung bình.

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:

Dùng cho người trên 18 tuổi: Uống từ 5 - 6 viên/ ngày, chia 3 lần, có thể dùng đơn độc glucosamin sulfat hoặc phối hợp với thuốc khác như Chondroitin 1200mg/ ngày. Thời gian dùng thuốc tùy theo cá thể, ít nhất dùng liên tục trong 2 đến 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị.

THẬN TRỌNG: Khi sử dụng thuốc cho người lái xe và vận hành máy móc.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Tương tác thuốc có thể xảy ra khi phối hợp Glucosamin với các thuốc: Acetaminophen, warfarin, thuốc chống đái tháo đường và một số thuốc hoá trị. Những tương tác thuốc có thể dẫn đến giảm sản xuất insulin, tăng nguy cơ chảy máu hoặc làm giảm hiệu quả của thuốc vì vậy yếu cầu phải giám sát thường xuyên.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Hiếm gặp, nhưng nhìn chung rất nhẹ, thoáng qua.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

SỬ DỤNG QUÁ LIỀU: Không có báo cáo về việc sử dụng quá liều.

LỜI KHUYẾN CÁO:

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.


Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ.

Để xa tầm tay trẻ em.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Vỉ 10 viên, Hộp 10 vỉ; Lọ 100 viên

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

 **CTY CP DƯỢC TW MEDIPHARCO-TENAMYD**
8 Nguyễn Trường Tộ - Tp.Huế - Việt Nam
ĐT: 054. 3823099 - 3827215 Fax: 054.3826077