

SÁNG MẮT

TRÌNH BÀY: Hộp 1 vỉ; 10 vỉ x 10 viên nang cứng.

THÀNH PHẦN: Công thức cho 1 viên nang cứng:

Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>)	125 mg
Hoài sơn (bột) (<i>Tuber Dioscoreae persimilis</i>)	160 mg
Đương quy (bột) (<i>Radix Angelicae sinensis</i>)	160 mg
Cao đặc rễ Trạch tả (<i>Extractum Rhizoma Alismatis</i>)	40 mg
(tương đương 100 mg Trạch tả)	
Cao đặc rễ Hà thủ ô đỏ (<i>Extractum Radix Fallopieae multiflorae</i>)	40 mg
(tương đương 200 mg Hà thủ ô đỏ)	
Cao đặc hạt Thảo quyết minh (<i>Extractum Semen Sennae torae</i>)	50 mg
(tương đương 200 mg Thảo quyết minh)	
Cao đặc hoa Cúc hoa (<i>Extractum Flos Chysanthemi indicis</i>)	24 mg
(tương đương 200 mg Cúc hoa)	
Cao đặc quả Hạ khô thảo (<i>Extractum Spica Prunellae</i>)	12,5 mg
(tương đương 125 mg Hạ khô thảo)	
Tá dược (PVP, bột Talc, magnesi stearat)	vđ 1 viên

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ:

Các bệnh về mắt do can thận âm hư, huyết hư như:

- Mờ mắt, nhức mắt, khô mắt, chói mắt khi ra nắng.
- Các trường hợp mắt đỏ nóng, xung huyết, hỗ trợ trong điều trị viêm võng mạc và viêm tuyến lệ.
- Thị lực giảm.
- Đau đầu chóng mặt, nóng đỉnh đầu, ban chẩn, dị ứng, mẩn ngứa (Đặc biệt vùng đầu mặt, trứng cá).

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

- Người lớn: 3- 4 viên/lần x 2-3 lần/ngày, uống với nước đun sôi để nguội.
- Trẻ em: 1-2 viên/lần x 2-3 lần/ngày, uống với nước đun sôi để nguội.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Phụ nữ có thai.

THẬN TRỌNG:

Thận trọng khi dùng cho người có Kali huyết cao, phụ nữ cho con bú.

TÁC DỤNG PHỤ:

Chưa có báo cáo về tác dụng phụ của thuốc gây nên. Nếu có bất thường khi dùng thuốc cần ngừng ngay và báo cho dược sỹ hoặc bác sỹ biết để xử lý.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN THẦY THUỐC