

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 8 / 11 / 2018

SARGIMIR150
Viên nang mềm

SARGIMIR150
Viên nang mềm

GMP
WHO

Hộp 6 vỉ x 10 viên nang mềm

Đề xa tầm tay của trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng

DKT
DUỐC HÀ TÂY



SARGIMIR150

Thành phần:
Mỗi viên nang mềm chứa:
L-Ornithin L- Aspartat 150mg
Tà dược vừa đủ 1 viên nang mềm

Chỉ định, chống chỉ định, cách dùng, liều dùng và các thông tin khác:
Xin xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Bảo quản: Để nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

Sản xuất tại:
CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
Là Khê, Hà Đông, TP. Hà Nội

SARGIMIR150
Softgels

GMP
WHO

Box of 6 blisters x 10 softgels

Keep out of reach the children.
Carefully read the accompanying before use

DKT
HATAY PHARM



SARGIMIR150
Viên nang mềm

SARGIMIR150

Composition: Each softgel contains
L-Ornithin L- Aspartat 150mg
Excipients q. s. 1 softgel

Indication, contraindication, administration dosage and other information
See the leaflet enclosed.

Specification: In-house.

Storage: Keep in a dry place, below 30°C.

Manufactured by:
HATAY PHARMACEUTICAL J.S.C
Là Khê, Hà Đông, Hà Nội City

SDK (Reg. No):
Số lô SX (Lot. No):
Ngày SX (Mfg Date):
HD (Exp. Date):



SARGIMIR150
Viên nang mềm

SARGIMIR150
Viên nang mềm



Hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm

Đề xa tâm tay của trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

SARGIMIR150

L-Ornithin L - Aspartat150mg
SDK (Reg. No):
SX tại: C. TY C/P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

SARGIMIR150

L-Ornithin L - Aspartat150mg
SDK (Reg. No):
SX tại: C. TY C/P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

SARGIMIR150

L-Ornithin L - Aspartat150mg
SDK (Reg. No):
SX tại: C. TY C/P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

SARGIMIR150

L-Ornithin L - Aspartat150mg
SDK (Reg. No):
SX tại: C. TY C/P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

SARGIMIR150

L-Ornithin L - Aspartat150mg
SDK (Reg. No):
SX tại: C. TY C/P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

HD:

SARGIMIR150
Viên nang mềm

Thành phần:

Mỗi viên nang mềm chứa:

L-Ornithin L - Aspartat150mg

Ta được coi là:1 viên nang mềm

Chỉ định, chống chỉ định, cách dùng, liều dùng và các thông tin khác: Xem văn tờ hướng dẫn sử dụng thuốc, bao bì trong hộp.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Bảo quản: Để nơi khô ráo độ

dưới 30°C

Số lô SX (Lot No):

Ngày SX (Mfg Date):

HD (Exp. Date):

Sản xuất tại:

CÔNG TY C/P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Là Khê, Hà Đông, TP. Hà Nội

SARGIMIR150
Softgels



Box of 12 blisters x 5 softgels

Keep out of reach the children.
Carefully read the accompanying before use



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

SARGIMIR150
Viên nang mềm

Composition: Each softgel contains

L-Ornithin L - Aspartat150mg

Excipient: q.s. 1 softgel

Indication, contraindication, administration dosage and other information: See the leaflet enclosed.

Specification: In house

Storage: Keep in a dry place.

Below 30°C

SDK (Reg. No):

Manufactured by:

HATAPHAR PHARMACEUTICAL, JSC

Là Khê, Hà Đông, Hà Nội City



Hướng dẫn sử dụng thuốc SARGIMIR 150

- **Dạng thuốc:** Viên nang mềm.
- **Qui cách đóng gói:** Hộp 12 vi x 5 viên, hộp 6 vi x 10 viên nang mềm.
- **Thành phần:** Mỗi viên nang mềm chứa:

L-Ornithin L-Aspartat	150mg
Tá dược vđ	1viên
- (Tá dược gồm: Dầu đậu nành, dầu cọ, sáp ong trắng, lecithin, aerosil, gelatin, glycerin, dung dịch sorbitol, nước tinh khiết, titan dioxyd, vanilin, nipagin, nipasol, phẩm màu chocolate, phẩm màu Tartrazin, phẩm màu Sunset yellow, ethanol 90⁰).
- **Chỉ định:** Dùng trong các trường hợp tăng Amoniac do mắc phải các bệnh về gan: Viêm gan cấp và mạn tính, xơ gan.
- **Cách dùng và liều dùng:** Theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc. Trung bình:
Uống mỗi lần 2-3 viên x 3 lần/ngày, tùy theo tuổi và triệu chứng bệnh.
Đợt dùng 3-4 tuần. Trong trường hợp bệnh nặng có thể dùng liều gấp đôi.
- **Chống chỉ định:** Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. Suy giảm chức năng thận.
- **Thận trọng:** Nếu dùng thuốc không thấy có tiến triển tốt, khi có triệu chứng khó chịu xảy ra hoặc có tác dụng không mong muốn nên ngừng thuốc và hỏi ý kiến của thầy thuốc.
- **Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:** Thuốc chỉ dùng cho phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con bú khi thật cần thiết theo chỉ dẫn của thầy thuốc.
- **Sử dụng cho người lái xe và vận hành máy móc:** Không dùng khi lái xe và vận hành máy móc.
- **Tác dụng không mong muốn của thuốc:** Thuốc có thể gây rối loạn tiêu hoá nhẹ, nôn, hoặc buồn nôn.
- * **Ghi chú:** "Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc".
- **Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác:** Chưa có tài liệu báo cáo.
- **Quá liều và xử trí:** Chưa có tài liệu báo cáo.
- **Hạn dùng:** 36 tháng tính từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.
- * **Lưu ý:** Khi thấy nang thuốc bị ẩm mốc, dính nang, nhãn thuốc in số lô SX, HD mờ...hay có các biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc tới hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.
- **Bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30⁰C.
- **Tiêu chuẩn áp dụng:** TCCS.

ĐỀ XA TÀM TAY TRẺ EM

"Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ"

THUỐC SẢN XUẤT TẠI: CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

La Khê - Hà Đông- TP. Hà Nội

ĐT: 04.33522203 FAX: 04.33522203

CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Tổng giám đốc



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thanh

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

DS. Nguyễn Bá Lai