



Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy không xảy ra tương tác với các thuốc như warfarin, aspirin (với acetylsalicylic), sulfamerazine, chlor-protazine, indomethacin.

TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Trường hợp có thai

Không có dữ liệu lâm sàng khi dùng diclofenac ở người có thai. Khả năng gây nguy cơ cho người dùng được xác lập. Do đó không nên dùng trong thời kỳ mang thai.

Trường hợp cho con bú

Không có dữ liệu. Tuy nhiên, vì an toàn, không nên dùng cho người cho con bú.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC :

Không có tác động

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC (ADR)

Thuốc được dùng nạp xác.

Các tác dụng không mong muốn thường gặp là tiêu chảy (37% bệnh nhân). Một vài trường hợp đau vùng dưới bụng được báo cáo. Việc thay đổi tiêu trong giai đoạn đầu điều trị (2 - 4 tuần lễ) có thể làm giảm tiêu hay giữa lúc các tác dụng phụ.

Các tác dụng phụ khác được báo cáo : nước tiểu đỏ sẫm (14,4%) và 1 trường hợp hạ kali huyết; nhiễm độc gan trong vòm gan cấp và hội chứng Lyell.

Hình ảnh các sự cố ADR

hỏa cơ, ngưng dùng thuốc và thông báo cho bác sĩ điều trị.

QUẢ LIỀU

Trong những trường hợp quả liểu thường gặp ra tiêu chảy hoặc táo bón. Cần thực hiện các điều trị triệu chứng và hỗ trợ như cần bằng điện giải, nếu cần.

ĐÓNG GÓI :

Hộp 1 vỉ - Vỉ 10 viên

Hộp chai 100 viên, hộp chai 200 viên và chai 500 viên

BẢO QUẢN :

Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C. Tránh ánh sáng

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG :

Tốt nhất có thể

HẠN DỤNG :

36 tháng kể từ ngày sản xuất.



Để an toàn tay của trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến Bác sĩ.

Sản xuất tại: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SA VI (SaViPharm JSC)**

Lô Z-01-02-03 KCN KCC Tân Thuận, Q.7, TP.HCM

Điện thoại : (84.8) 37700142-143-144

Fax : (84.8) 37700143

Tp. HCM, ngày // tháng // năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Thành

