



9/80 BSf

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC TIÊM SCIOMIR Thiocolchicosid 2mg/ml

TRÌNH BÀY: Hộp 06 ống thuốc tiêm 2ml.

THÀNH PHẦN

Mỗi ống chứa:

Thiocolchicosid.....4 mg

Tá dược: Natri clorid

Nước cất pha tiêm vừa đủ.....2 ml

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC

Thiocolchicoside là một hợp chất bán tổng hợp có lưu huỳnh của một glycosid thiên nhiên trích cây colchico, có tác dụng giãn cơ mà không có ảnh hưởng như nhura độc. Một số tài liệu nhấn mạnh đến tác động chủ vận một cách có chọn lọc trên thụ thể GABAergic và glycinergic. Các tác động đó có thể giải thích tác dụng của Thiocolchicosid lên sự co cứng cơ do chấn thương và bệnh thấp khớp và cả sự co cứng cơ có nguồn gốc thần kinh trung ương.

Thiocolchicoside không làm thay đổi các vận động chủ động và cũng không gây trở ngại cho các cơ hô hấp.

Thiocolchicoside không có tác dụng trên hệ thống tim mạch.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC

Tác dụng giãn cơ xuất hiện sau khoảng 1-2 giờ nếu dùng đường uống và sau khoảng 30-40 phút nếu dùng theo đường tiêm bắp. Sinh khả dụng khoảng 25% qua đường uống và 75% qua đường tiêm bắp.

Thời gian bán thải trung bình là 4,5 giờ. Không có sự tích lũy thuốc sau khi dùng liều lặp lại 8mg trong 7 ngày. Thiocolchicosid được chuyển hóa rộng rãi trong huyết tương. Trung bình 8% liều đơn nếu dùng đường uống và 20% liều đơn nếu dùng đường tiêm bắp được đào thải qua đường nước tiểu.

CHỈ ĐỊNH

Hậu quả chứng liệt nửa người co cứng, bệnh Parkinson và hội chứng liệt rung Parkinson do thuốc, đặc biệt là liên quan đến hội chứng rối loạn vận động, đau dây thần kinh thắt lưng-hông cấp và mãn tính, đau dây thần kinh cổ-cánh tay, cổ cứng kéo dài, đau sau chấn thương và hậu phẫu.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Chứng liệt nhão, giảm trương lực cơ.

Tiền sử dị ứng với Thiocolchicosid và các thành phần tá dược trong thuốc.

Phụ nữ mang thai và cho con bú.

THẬN TRỌNG

Nên giảm liều dùng kịp thời khi xuất hiện tác dụng phụ.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Mặc dù trong các nghiên cứu trên động vật không thấy có tác dụng gây quái thai khi sử dụng Thiocolchicosid ở liều cao gấp nhiều lần liều dùng cho người (cao hơn 10 lần liều điều trị), để



thân trọng không nên chỉ định Thiocolchicosid cho phụ nữ mang thai. Không nên dùng cho phụ nữ đang cho con bú do thiocolchicosid được bài tiết qua sữa mẹ.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI TÀU XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Mặc dù hiếm khi xuất hiện buồn ngủ, nhưng cần phải cân nhắc sử dụng thuốc trong lái tàu xe và vận hành máy móc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN (ADR)

Hiếm gặp: tình trạng khó chịu, hạ huyết áp có kèm theo hoặc không sự mất ý thức, trạng thái kích động hoặc ám ảnh tạm thời, buồn ngủ.

Phát ban và nổi mẩn ngoài da cũng được biết đến nhưng không thường xuyên.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn phải khi sử dụng thuốc.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Tiêm bắp 2 ống trong 24 giờ hoặc theo kê đơn của bác sĩ.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Chưa được biết.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ

Không có trường hợp quá liều nào được biết đến và báo cáo trong các tài liệu tham khảo được.

BẢO QUẢN, HẠN DÙNG, TIÊU CHUẨN

Bảo quản: nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 3 năm kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn: TCCS

Để xa tầm tay của trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của bác sĩ

Không dùng thuốc đã biến màu, hết hạn sử dụng...

Muốn biết thêm thông tin xin hỏi ý kiến của Bác sĩ

Nhà sản xuất: LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.r.l.

Via Dante Alighieri, 71 - 18038 SANREMO - IM - ITALY

Tel: + 39-0184-59241

Fax: +39-0184-504507



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thành