

SICUGARIN

Thành phần cấu tạo:

Mỗi viên chứa: Cao khô *Carduus marianus* 250,0 mg (tương đương 140,0 mg silymarin)

Tá dược: Microcrystalline cellulose, lactose monohydrat, tinh bột mỳ, PVP K30, talc, magnesi stearat, aerosil, eudragit E100, HPMC E606, PEG 6000, titan dioxyd, oxyd sắt đỏ, sunset yellow, chocolate brown HT, tween 80 vừa đủ 1 viên.

Dạng bào chế: Viên nén bao phim

Tác dụng:

Cao khô *Carduus marianus* (hay milk thistle, *Silybum marianum*) có thành phần hoạt chất chính silymarin là một hỗn hợp các flavonolignan gồm silybin, isosilybin, silychristin và silydianin, trong đó silybin có tác dụng sinh học mạnh nhất.

Silymarin giúp bảo vệ tế bào gan do có tác dụng chống oxy hóa, ức chế sự peroxid hóa lipid và tăng cường giải độc gan. Silymarin còn có tác dụng chống viêm, tăng tổng hợp protein của tế bào gan do đó kích thích sự phục hồi và tái tạo các tế bào gan.

Chỉ định:

Hỗ trợ điều trị các bệnh về gan: Viêm gan do virus (cấp hoặc mạn tính), xơ gan, gan nhiễm mỡ.

Phòng và hỗ trợ điều trị các tổn thương gan do rượu, bia, do sử dụng các thuốc gây độc cho gan (như các thuốc điều trị lao, khớp, tiểu đường...).

Hỗ trợ điều trị các trường hợp rối loạn chức năng gan biểu hiện: Mệt mỏi, chán ăn, ăn khó tiêu, dị ứng, mẩn ngứa.

Liều dùng, cách dùng:

Người lớn: Uống 1 - 2 viên/ ngày

Không dùng cho trẻ dưới 18 tuổi vì còn thiếu dữ liệu về an toàn và hiệu quả của thuốc.

Chống chỉ định:

Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc

Tắc mật hoàn toàn, suy tế bào gan nặng

Trẻ em dưới 18 tuổi

Phụ nữ mang thai và cho con bú

Thận trọng khi dùng thuốc:**Các tình trạng cần thận trọng khi dùng thuốc:**

Không dùng quá liều quy định.

Thuốc chỉ có tác dụng nếu tránh được các nguyên nhân gây tổn thương gan (như rượu, bia).

Các khuyến cáo dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Không dùng thuốc trong thời kỳ mang thai và cho con bú vì chưa có đủ dữ liệu an toàn về việc dùng *Carduus marianus* trên phụ nữ có thai và cho con bú.

Ảnh hưởng của thuốc đối với công việc (người vận hành máy móc, đang lái tàu xe, người làm việc trên cao và các trường hợp khác):

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng vận hành máy móc, lái tàu xe.

Tương tác thuốc: Chưa có thông tin**Tác dụng không mong muốn:**

Với liều thông thường rất hiếm gặp tác dụng không mong muốn.

Khi dùng cao *Carduus marianus* ở liều cao (>1500 mg/ ngày) có thể gây tác dụng nhuận tràng, dị ứng nhẹ.

Quá liều và cách xử trí:

Chưa có dữ liệu về dùng quá liều trên người. Tác dụng phụ có thể tăng lên.

Điều trị triệu chứng và hỗ trợ nếu cần.

Điều kiện bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc quá hạn

Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 6 vỉ x 10 viên. Vỉ PVC/ nhôm



Nhà sản xuất:

CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Trụ sở: 358 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

SX tại: 356 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

MEDIPLANTEX ĐT: 024.36686111; Fax: 024.38641584



SICUGARIN

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Thành phần và hàm lượng của thuốc:

Mỗi viên chứa: Cao khô *Carduus marianus* 250,0 mg (tương đương 140,0 mg silymarin)

Tá dược: Microcrystalline cellulose, lactose monohydrat, tinh bột mỳ, PVP K30, talc, magnesi stearat, aerosil, eudragit E100, HPMC E606, PEG 6000, titan dioxyd, oxyd sắt đỏ, sunset yellow, chocolate brown HT, tween 80 vừa đủ 1 viên.

Mô tả sản phẩm: Viên nén dài, bao phim màu nâu.

Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 6 vỉ x 10 viên. Vỉ PVC/ nhôm

Thuốc dùng cho bệnh gì:

Hỗ trợ điều trị các bệnh về gan: Viêm gan do virus (cấp hoặc mạn tính), xơ gan, gan nhiễm mỡ.

Phòng và hỗ trợ điều trị các tổn thương gan do rượu, bia, do sử dụng các thuốc gây độc cho gan (như các thuốc điều trị lao, khớp, tiểu đường...).

Hỗ trợ điều trị các trường hợp rối loạn chức năng gan biểu hiện: Mệt mỏi, chán ăn, ăn khó tiêu, dị ứng, mẩn ngứa.

Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng:

Người lớn uống 1 - 2 viên/ ngày hoặc dùng theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Không dùng cho trẻ dưới 18 tuổi vì còn thiếu dữ liệu về an toàn và hiệu quả của thuốc.

Khi nào không nên dùng thuốc này:

Mẫn cảm (dị ứng) với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Tắc mật hoàn toàn, suy tể bào gan nặng.

Trẻ em dưới 18 tuổi.

Phụ nữ mang thai và cho con bú.

Tác dụng không mong muốn:

Với liều thông thường rất hiếm gặp tác dụng không mong muốn.

Khi dùng cao *Carduus marianus* ở liều cao (>1500 mg/ngày) có thể gây tác dụng nhuận tràng, dị ứng nhẹ.

Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này:

Chưa có thông tin

Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc:

Không nên dùng liều gấp đôi, tiếp tục uống viên còn lại theo hướng dẫn.

Cần bảo quản thuốc này như thế nào: Để xa tầm nhìn và tầm với của trẻ em.

Đề thuốc trong bao gói ban đầu để tránh ẩm, bảo quản nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều:

Chưa có dữ liệu về dùng quá liều trên người. Các tác dụng phụ có thể tăng lên

Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo:

Nếu bạn dùng thuốc quá liều, hãy mang theo vỉ/ hộp thuốc của bạn đến gặp bác sĩ hoặc dược sĩ để được tư vấn.

Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này:

Các tình trạng cần thận trọng khi dùng thuốc:

Không dùng quá liều quy định. Thuốc chỉ có tác dụng nếu bạn tránh được các nguyên nhân gây tổn thương gan (như rượu, bia).

Các khuyến cáo dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Không dùng thuốc trong thời kỳ mang thai và cho con bú.

Ảnh hưởng của thuốc đối với công việc (người vận hành máy móc, đang lái tàu xe, người làm việc trên cao và các trường hợp khác):

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng vận hành máy móc, lái tàu xe.

Khi nào cần tham vấn bác sĩ, dược sĩ: Cần thông báo cho bác sĩ, dược sĩ khi các tác dụng không mong muốn trở nên nghiêm trọng hoặc xuất hiện tác dụng không mong muốn không được liệt kê trong tờ hướng dẫn sử dụng này.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

Hạn dùng của thuốc: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc sau ngày hết hạn được ghi trên vỉ/ hộp thuốc.



MEDIPLANTEX

Nhà sản xuất:

CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Trụ sở: 358 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

SX tại: 356 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: 024.36686111; Fax: 024.38641584