

Vaginal soft gel capsules.

**THÀNH PHẦN:** TiAB (Titan dioxide liên kết đồng hóa trị I với ion bạc ở dạng tinh thể có kích thước siêu nhỏ), Natri hyaluronat, cao Aloe Barbadensis, Caprylic/capric Triglyceride, Peg-6 Stearate (and) Glycol Stearate (and) PEG-32 Stearate, Glyceryl Stearate.

**MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:**

Viên nang đặt âm đạo SILNOZIGYN là một công thức dưới dạng viên nang mềm có độ tan rã nhanh, trong đó có chứa các thành phần khác nhau mà nhờ tính chất của các thành phần này tạo thành một hàng rào bảo vệ - hỗ trợ và điều trị viêm, nhiễm trùng âm đạo- âm hộ do các tác nhân vi khuẩn, virus, nấm như Candida, micotic và nhiễm khuẩn như viêm âm đạo/ âm hộ, herpes sinh dục và mụn cọc cũng như các tổn thương sau sinh.

SILNOZIGYN có tác dụng như là một hàng rào bảo vệ vết thương để cách ly và bảo vệ mô khỏi các nhân tố gây kích thích và giúp làm lành và liền sẹo. Sản phẩm này là một tác động kép với nhiều công dụng:

- Làm cách ly vết thương khỏi sự tấn công của các vi khuẩn bên ngoài.
- Ngăn ngừa và hạn chế sự xâm lấn sâu của các vi khuẩn vào vết thương vùng âm đạo – âm hộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự tái tạo các mô và liền sẹo vùng âm đạo – âm hộ. Phục hồi độ pH tự nhiên và hệ sinh thái âm đạo, duy trì âm đạo khỏe mạnh.

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:**

Mỗi ngày đặt một viên nang vào âm đạo, tốt nhất vào buổi tối trước khi ngủ.

- 1) Trước khi đặt, vệ sinh sạch vùng âm đạo.
- 2) Đặt viên nang vào sâu âm đạo
- 3) Sử dụng liên tục trong 7 ngày

- Nên sử dụng sản phẩm này khi thấy các triệu chứng ban đầu (như ngứa, rát, khó chịu ...) trước khi xuất hiện các tổn thương nặng (như đỏ, mụn nước, viêm loét). Không bắt buộc dừng lại một thời gian sau một trị liệu đặt trung khác.

**CẢNH BÁO:**

- \* Chỉ sử dụng sản phẩm khi biểu mô còn nguyên.
- \* Không sử dụng sản phẩm ngoài các chỉ định như trong tờ hướng dẫn sử dụng này.
- \* Rửa sạch tay trước khi sử dụng.
- \* Không sử dụng sản phẩm này sau khi hết hạn.
- \* Không để sản phẩm trong tủ đá.

\* Để xa tầm tay trẻ em.

\* Sản phẩm dùng tại chỗ - không được uống.

\* Không sử dụng sản phẩm khi sản phẩm đã bị mở và bị hư hỏng.

\* Không được tiệt trùng.

\* Không sử dụng trong trường hợp được biết mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.

\* Ngừng trị liệu trong trường hợp có phản ứng da bất thường.

\* Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ phòng và để xa nguồn nhiệt.

\* Trong trường hợp dùng kéo dài tham khảo ý kiến bác sĩ.

\* Sản phẩm này không phải là một sản phẩm diệt tinh trùng hay tránh thai.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**


Mẫn cảm với các thành phần của sản phẩm

Chưa có hiện tượng nào được ghi nhận về quá liều. Chưa có hiện tượng nào được biết về tương tác với các thuốc.

**ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN:**

Tránh để nơi ẩm ướt và các nguồn nhiệt.

Nếu chế phẩm bị tiếp xúc với ánh sáng, chế phẩm có thể có màu hanh vàng, nhưng không ảnh hưởng tới chất lượng của sản phẩm và hạn sử dụng.

**Quy cách đóng gói:** Hộp 1 vỉ x 10 viên nang mềm.**Xuất xứ:** NTC S.R.L/ ITALY

0477



Công ty sở hữu sản phẩm:

NTC Srl

Via Luigi Razza 3  
20124 Milano - Italia