

08/12/2013

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 01/12/2013

SINOVA 500

Hộp 3v x 10v nang

Box: 136 x 79 x 30 mm

Blister: 131 x 74 mm

SINOVA 500

Glucosamine sulfate 500 mg



Oral route

Box of 3 blisters x 10 capsules



SINH PHẨM
Số SX/Lot No.:
NSX/MBE
HD/Exp:

THÀNH PHẦN: Glucosamin sulfat 500 mg và các tá dược vừa đủ một viên nang.
CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không qua 30 °C.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
Áp 2, Xã Tân Thanh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM.

SINOVA500

Glucosamine sulfate 500mg

WHO-GMP

SINOVA 500

Glucosamin sulfat 500 mg



Thuốc uống

Hộp 3 vỉ x 10 viên nang



SINOVA 500
Glucosamin sulfat 500 mg

COMPOSITION: Glucosamine sulfate 500mg and excipients sq. for 1 capsule.

INDICATION, ADMINISTRATION, CONTRAINDICATION AND FURTHER INFORMATION: Refer to package insert.

STORAGE: In a dry place, temperature not exceeding 30 °C.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE.

Manufacturer: BV PHARMA JOINT STOCK COMPANY
Hamlet 2, Tân Thanh Tây Village, Củ Chi District, HCMC.

SINOVA500

Glucosamine sulfate 500 mg

WHO-GMP



Handwritten signature or mark.

SINOVA 500

Chai 60 viên nang
Box: 55 x 75 x 55 mm
Blister: 165 x 32 mm

SINOVA 500

Glucosamine sulfate 500 mg



Oral route
Box of 1 bottle of 60 capsules



SDK/Msa:
Số lô SX/Lot No.:
NSX/Mfd:
HD/Exp:

COMPOSITION: Glucosamine sulfate 500mg and excipients sq. for 1 capsule.
INDICATION, ADMINISTRATION, CONTRAINDICATION AND FURTHER INFORMATION: Refer to package insert.
STORAGE: In a dry place, temperature not exceeding 30°C.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE.

Manufacturer:
BV PHARMA JOINT STOCK COMPANY
Hamlet 2, Tân Thanh Tây Village, Củ Chi District, HCMC.

SINOVA 500

Glucosamine sulfate 500 mg

WHO - GMP

COMPOSITION: Glucosamine sulfate 500mg and excipients sq. for 1 capsule.
INDICATION, ADMINISTRATION, CONTRAINDICATION AND FURTHER INFORMATION: Refer to package insert.
STORAGE: In a dry place, temperature not exceeding 30°C.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE.

WHO - GMP
Manufacturer:
BV PHARMA JOINT STOCK COMPANY
Hamlet 2, Tân Thanh Tây Village, Củ Chi District, HCMC.

Glucosamin sulfat 500 mg

SINOVA 500

SINOVA 500

Glucosamin sulfat 500 mg



Thuốc uống
Hộp 1 chai 60 viên nang

THÀNH PHẦN: Glucosamin sulfat 500 mg và các tá dược vừa đủ một viên nang.
CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.
BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.
ĐỂ XA TẮM TAY TRẒEM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
Áp 2, xã Tân Thanh Tây, huyện Củ Chi, TP. HCM.

SINOVA 500

Glucosamin sulfat 500 mg

WHO - GMP

THÀNH PHẦN: Glucosamin sulfat 500 mg và các tá dược vừa đủ một viên nang.
CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.
BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.
ĐỂ XA TẮM TAY TRẒEM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Số lô SX/Lot No.:
HĐ/Exp:
Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
Áp 2, xã Tân Thanh Tây, huyện Củ Chi, TP. HCM.

SINOVA 500

Glucosamin sulfat 500 mg



Thuốc uống
Chai 60 viên nang

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

SINOVA 500 Viên nang

THÀNH PHẦN: Glucosamin sulfat 2 KCL 664 mg (tương đương với Glucosamin sulfat 500 mg) và các tá dược gồm Cellulose vi tinh thể và Magnesi stearat vừa đủ 1 viên nang.

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 3 vỉ x 10 viên nang, Hộp 1 chai 60 viên nang.

DƯỢC LỰC: Glucosamin là chất chủ yếu tạo nên sụn khớp, có đặc tính kích thích tạo sụn khớp, ức chế các enzym phá hủy sụn khớp và làm tăng sản xuất chất nhầy bôi trơn khớp giúp cử động được dễ dàng. Glucosamin được dung nạp rất tốt và các nghiên cứu cho thấy lợi ích của sử dụng thuốc trong điều trị thoái hóa khớp giảm được mức sử dụng liều thuốc chống viêm Non-steroid và thuốc có tác dụng kéo dài sau vài tháng.

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ :

Viên nang SINOVA 500 được dùng để làm giảm triệu chứng của viêm khớp gối nhẹ và trung bình.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Liều lượng: 1 viên x 2 - 3 lần / ngày.

Cách dùng: Uống vào các bữa ăn, Một đợt điều trị từ 2 – 3 tháng tùy tình trạng bệnh, có thể lặp lại 2 -3 đợt một năm nếu cần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH :

- Quá mẫn cảm với Glucosamin hoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc .
- Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi (do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị).

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG:

- Đối với người cao tuổi, khi dùng lâu dài cần kiểm tra chức năng gan, thận và công thức máu định kỳ.
- Do thuốc điều trị nguyên nhân nên tác dụng của thuốc có thể bắt đầu sau một tuần trở đi, vì vậy nếu đau nhiều có thể kết hợp thêm thuốc giảm đau chống viêm trong những ngày đầu.
- Dùng thận trọng cho bệnh nhân đái tháo đường.

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC :

- Người đang dùng thuốc lợi tiểu cần dùng liều lớn hơn : 20mg / kg / ngày.
- Khi dùng chung với Heparin có khả năng làm tăng nguy cơ chảy máu.

TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Không dùng thuốc cho phụ nữ trong thời kỳ mang thai hoặc cho con bú.

TÁC DỤNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Không có tài liệu đề cập đến.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Không có báo cáo.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN :

- Glucosamin không gây tác dụng phụ trên dạ dày ruột như các thuốc chống viêm không steroid.
- Tác dụng phụ thường rất nhẹ và thoáng qua. Hiếm khi gặp khó chịu ở dạ dày, nôn, ăn khó tiêu hay tiêu chảy, khi đó nên uống thuốc trong bữa ăn.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ.

NHÀ SẢN XUẤT:

CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA

Địa chỉ: Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM.

Điện thoại: 08 – 37950.611 / 957 / 994

Fax : 08 - 37950.614 Email: info@bvpharma.com.vn

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thanh