

31/155

UBND TỈNH HÀ TĨNH  
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH  
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh

MẪU NHÃN TÚI, HỘP XIN ĐĂNG KÝ

**Sirnakarang F<sup>®</sup>**

Mỗi gói 6g chứa:  
Cao khô kim liên thảo (Extractum Desmodii styractilum) ..... 1,75g  
tương đương với 17,5g kim liên thảo

Lactose ..... 4,10g  
PVP K30 ..... 0,05g  
Talc (talcum) ..... 0,05g  
Magnesi stearat ..... 0,05g

**Chỉ định:** Phòng và trị sỏi thận, sỏi đường tiết niệu, sỏi bàng quang, sỏi mật. Trị viêm đường tiết niệu, viêm túi mật

**Liều dùng:** Điều trị ngày uống hai lần mỗi lần một gói vào buổi sáng và tối, dùng liên tục trong 1-2 tháng

**Dự phòng và ngăn ngừa tái phát sỏi thận:** Mỗi ngày uống 1 gói, dùng liên tục trong một tháng.

**Cách dùng:** Hoà gói Sirnakarang F vào khoảng 100ml-200ml nước ấm khuấy đều để uống

**Lưu ý:** Trong thời gian dùng thuốc nên uống nhiều nước, uống 150-200 ml nước/lần x 2-3 lít nước mỗi ngày.

**Chống chỉ định, thông tin khác:**  
Xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo

**Tiêu chuẩn áp dụng:** TCCS

**Bảo quản:** Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng

BỘ Y TẾ  
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 5/9/2016

*(Handwritten signature)*

SPK:  
SỐ LÔ SX:  
NGÀY SX:  
HD:

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG  
BỀ THUỐC XA TÂM TAY TRẼ EM

**Sirnakarang F<sup>®</sup>**  
Thuốc cốm trị sỏi thận, sỏi mật

**Sirnakarang F<sup>®</sup>**  
Thuốc cốm trị sỏi thận, sỏi mật

GMP-WHO

**Sirnakarang F<sup>®</sup>**  
Thuốc cốm trị sỏi thận, sỏi mật

Hộp 10 gói x 6g

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**  
167 Hà Huy Tập - TP. Hà Tĩnh  
ĐT: 043.990.6195 - Fax: 043.864.9828

**HADIPHAR**

GMP-WHO

**Sirnakarang F<sup>®</sup>**  
Thuốc cốm trị sỏi thận, sỏi mật

Gói 6g

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**  
167 Hà Huy Tập - TP. Hà Tĩnh  
ĐT: 043.990.6195 - Fax: 043.864.9828

**HADIPHAR**

Sản xuất tại Nhà máy sản xuất thuốc đông dược CDM-TTCN bác Cẩm Xuyên- Xã Cẩm Vinh- Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh

ĐT: 043.990.6195 - Fax: 043.864.9828

167 Hà Huy Tập - TP. Hà Tĩnh

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

**Sirnakarang F<sup>®</sup>**  
Thuốc cốm trị sỏi thận, sỏi mật

**Sirnakarang F<sup>®</sup>**

Mỗi gói 6g chứa:  
Cao khô kim liên thảo (Extractum Desmodii styractilum) ..... 1,75g  
tương đương với 17,5g kim liên thảo

Lactose ..... 4,10g  
PVP K30 ..... 0,05g  
Talc (talcum) ..... 0,05g  
Magnesi stearat ..... 0,05g

**Chỉ định:** Phòng và trị sỏi thận, sỏi đường tiết niệu, sỏi bàng quang, sỏi mật. Trị viêm đường tiết niệu, viêm túi mật

**Liều dùng:** Điều trị ngày uống hai lần mỗi lần một gói vào buổi sáng và tối, dùng liên tục trong 1-2 tháng

**Dự phòng và ngăn ngừa tái phát sỏi thận:** Mỗi ngày uống 1 gói, dùng liên tục trong một tháng.

**Cách dùng:** Hoà gói Sirnakarang F vào khoảng 100ml-200ml nước ấm khuấy đều để uống

**Lưu ý:** Trong thời gian dùng thuốc nên uống nhiều nước, uống 150-200 ml nước/lần x 2-3 lít nước mỗi ngày.

**Chống chỉ định, thông tin khác:**  
Xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo

**Tiêu chuẩn áp dụng:** TCCS

**Bảo quản:** Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng

Sản xuất tại Nhà máy sản xuất thuốc đông dược CDM-TTCN bác Cẩm Xuyên- Xã Cẩm Vinh- Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh

SPK:  
Số lô SX:  
HD:

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 5 năm 2015  
TỔNG GIÁM ĐỐC

*(Red circular stamp: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH, M.S.D.N.: 3000104...)*

*(Handwritten signature)*

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Võ Đức Nhân

## TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CỐM SIRNAKARANG F

Công thức bào chế cho 1 gói cốm 6g

Cao khô kim tiền thảo (*Extractum siccum Desmodii styracifolii*) 1,75g

tương ứng với 17,5g kim tiền thảo

**Tá dược** Lactose, PVP K30, Talc, Magnesi stearat, vừa đủ 1 gói

**Chỉ định:** Phòng và trị sỏi thận, sỏi đường tiết niệu, sỏi bàng quang, sỏi mật. Trị viêm đường tiết niệu, viêm túi mật.

**Liều lượng và cách dùng :**

Điều trị: Ngày uống hai lần mỗi lần một gói vào buổi sáng và tối, dùng liên tục trong 1-2 tháng

Dự phòng và ngăn ngừa tái phát sỏi thận: Mỗi ngày một gói, dùng liên tục trong một tháng.

Cách dùng: Hoà gói Sirnakarang vào khoảng 100ml -200ml nước ấm khuấy đều để uống.

Lưu ý: Trong thời gian dùng thuốc nên uống nhiều nước, uống 150-200 ml nước/lần, 2-3 lít nước mỗi ngày.

**Chống chỉ định:** Quá mẫn cảm với bất cứ một trong những thành phần của thuốc. Không dùng cho người tiểu đường, phụ nữ có thai.

**Tác dụng không mong muốn của thuốc:** Chưa có thông tin

**Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc**

**Thận trọng:** Người bị đau dạ dày nên uống thuốc sau khi ăn.

**Tương tác với các thuốc khác, các dạng tương tác khác:** Chưa có thông tin

**Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:**

- Phụ nữ có thai : Không được dùng

- Phụ nữ cho con bú : Nên hỏi ý kiến thầy thuốc trước khi sử dụng

**Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:** Chưa có thông tin

**Quá liều và cách xử trí:** Chưa có thông tin

**Qui cách đóng gói:** (PE/Al), gói 6 gam, hộp 10 gói.



**Bảo quản:** Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30<sup>0</sup>C, tránh ánh sáng.

**Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**Tiêu chuẩn áp dụng:** TCCS.

ĐỀ THUỐC XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG  
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SỸ.



**HADIPHAR**

**CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH**

Trụ sở chính: 167 – Hà Huy Tập – Thành phố Hà Tĩnh

ĐT: 0393 854617 – 3 855906 Fax : 3856821

ĐT: 043.990.6195 – 043.668.6226

Sản xuất tại: Nhà máy sản xuất thuốc đông dược, Cụm Công Nghiệp – Tiểu thủ Công nghiệp  
Bắc Cẩm Xuyên – Xã Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Hà Tĩnh, ngày 5 tháng 5 năm 2014



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Võ Đức Nhân**



**TUQ.CỤC TRƯỞNG  
P.TRƯỞNG PHÒNG  
Lỗ Minh Hùng**