

CADITADIN

Siro Loratadin 1mg/1ml

Thành phần:

Mỗi chai 50 ml siro CADITADIN chứa:

Loratadin 50 mg

Tá dược: Đường RE, Propylen glycol, Polyvinyl pyrrolidon (PVP K30), Methyl paraben, Propyl paraben, Acid citric, Natri saccharin, Ethanol 96%, Mùi Raspberry, Nước tinh khiết.

Phân loại: Thuốc kháng histamin dùng đường toàn thân.

Chỉ định:

Điều trị các triệu chứng liên quan đến viêm mũi dị ứng như hắt hơi, chảy nước mũi, ngứa mũi.

Điều trị các triệu chứng, dấu hiệu mề đay mạn tính và các rối loạn dị ứng ngoài da khác.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần biết thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Liều lượng và đường dùng:

- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: uống 10ml x 1 lần/ngày.

- Trẻ em từ 2 đến 12 tuổi:

+ Cân nặng trên 30 kg: uống 10ml x 1 lần/ngày.

+ Cân nặng dưới 30 kg: uống 5ml x 1 lần/ngày.

- An toàn và hiệu quả khi dùng Loratadin cho trẻ em dưới 2 tuổi chưa được xác định.

- Người bị suy gan hoặc suy thận nặng (độ thanh thải creatinin < 30ml/phút), dùng liều ban đầu là 10 ml siro, cứ 2 ngày một lần.

Cách dùng:

Dùng đường uống.

Chống chỉ định:

Không dùng thuốc cho người nhạy cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Thận trọng:

Bệnh nhân suy gan.

Khi dùng Loratadin có nguy cơ khô miệng, đặc biệt ở người cao tuổi và tăng nguy cơ sâu răng.

Do đó cần phải vệ sinh răng miệng sạch sẽ khi dùng Loratadin.

Phụ nữ có thai và cho con bú:

Phụ nữ có thai:

Chưa có những nghiên cứu đầy đủ về sử dụng Loratadin trong thai kỳ. Do đó chỉ dùng Loratadin trong thai kỳ khi cần thiết, với liều thấp và trong thời gian ngắn.

Thời kỳ cho con bú:

Loratadin và chất chuyển hóa descarboethoxyLoratadin bài tiết vào sữa mẹ. Nếu cần sử dụng Loratadin ở người cho con bú, chỉ dùng Loratadin với liều thấp và trong thời gian ngắn.

Lái xe và vận hành máy móc:

Không dùng thuốc khi đang lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác thuốc:

Khi dùng đồng thời với rượu, Loratadin không có tác dụng mạnh như đo được ở các nghiên cứu tâm thần vận động.

Các thử nghiệm lâm sàng được kiểm soát cho thấy có sự gia tăng nồng độ Loratadin trong huyết tương sau khi dùng đồng thời với ketoconazole, erythromycin hoặc cimetidin, nhưng không có sự thay đổi đáng kể (kể cả thay đổi trên điện tâm đồ). Nên thận trọng khi sử dụng cùng lúc với các dược phẩm được biết có tác động ức chế chuyển hóa gan cho đến khi có kết quả nghiên cứu đầy đủ về tương tác thuốc.

Ảnh hưởng của thuốc đến kết quả xét nghiệm: Nên ngừng sử dụng Loratadin khoảng 48 giờ trước khi tiến hành các tiến trình thử nghiệm trên da vì các thuốc kháng histamine có thể làm mất hoặc giảm những dấu hiệu của các phản ứng dương tính ngoài da.

Tác dụng phụ

Khi sử dụng Loratadin với liều lớn hơn 10 mg hàng ngày có thể xảy ra những tác dụng phụ như: buồn nôn, nổi mề đay, đau đầu, khô miệng, chóng mặt, khô mũi, hắt hơi, viêm kết mạc, tim đập nhanh, loạn nhịp nhanh trên thất, đánh trống ngực.

Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều và cách xử trí:

Biểu hiện:

Ở người lớn khi uống quá liều Loratadin (40-180mg) có những biểu hiện như: buồn ngủ, nhịp tim nhanh, nhức đầu. Ở trẻ em khi uống siro quá liều (vượt 10mg) có biểu hiện ngoại tháp và đánh trống ngực.

Cách xử trí:

Trường hợp quá liều Loratadin cấp, gây nôn bằng siro ipeca để tháo sạch dạ dày ngay. Dùng than hoạt sau khi gây nôn có thể giúp ích để ngăn ngừa hấp thu Loratadin. Nếu gây nôn không kết quả hoặc chống chỉ định (thí dụ ở người bị ngất, co giật hoặc thiếu phản xạ nôn) có thể tiến hành rửa dạ dày với dung dịch Natri clorid 0,9% và đặt ống nội khí quản để phòng ngừa hít phải dịch dạ dày.

Lưu ý Loratadin không bị loại bằng thẩm tách máu.

Dạng trình bày

Chai 50ml/60ml/100ml đựng trong hộp giấy carton.

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn cơ sở.

Hạn dùng

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản

Bảo quản thuốc ở nơi khô, thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Để thuốc xa tầm tay trẻ em.

Nhà sản xuất:

CÔNG TY TNHH US PHARMA USA

Địa chỉ : Lô B1- 10, Đường D2, KCN Tây Bắc Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

Mọi thắc mắc và thông tin chi tiết, xin liên hệ về số điện thoại 08 37908860 – 08 37908861,

Fax: 08 37908856



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh