



MẪU NHÃN VÀ TỜ HƯỚNG DẪN DÙNG THUỐC

Tên, địa chỉ cơ sở đăng ký và sản xuất:

CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC

6A 3 quốc lộ 60 p.Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Tên thuốc: **SMECTANEO**

Dạng thuốc: Thuốc bột uống.


Nồng độ, hàm lượng:

-Diosmectite

3 g

Loại thuốc đăng ký: Thuốc hoá dược.

Loại hình đăng ký: Đăng ký lần đầu.



Năm 2012

Lần đầu: 01/...4/2013

MẪU ĐĂNG KÝ TOA THUỐC SMECTANEO

Tiêu chuẩn: TCCS

SMECTANEO

THÀNH PHẦN:

Diosmectit 3 g

Tá dược: Lactose, aspartam, vanilin vừa đủ 1 gói.

DẠNG BẢO CHẾ: Thuốc bột uống.

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 30 gói x 3,5 g.

CHỈ ĐỊNH:

-Điều trị triệu chứng đau của viêm thực quản - dạ dày - tá tràng và đại tràng.

-Tiêu chảy cấp và mạn tính sau khi đã bù nước và điện giải mà vẫn còn tiêu chảy kéo dài.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

THẬN TRỌNG:

-Phải bù nước nếu cần (đường uống hoặc tiêm tĩnh mạch) tùy theo tuổi, cơ địa bệnh nhân và mất nước do tiêu chảy.

-Khi có sốt không dùng quá 2 ngày.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Không có chống chỉ định.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Không có ảnh hưởng đáng kể.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Có thể gây ra hoặc làm tăng táo bón nhưng rất hiếm.

Thông báo cho Bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Tính chất hấp phụ của diosmectite có thể thay đổi thời gian và/hoặc sự hấp thu của thuốc khác, do đó nên uống cách khoảng với thuốc này.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Trẻ em:

-Dưới 1 tuổi: ngày uống 1 gói, chia 2 - 3 lần.

-Từ 1 - 2 tuổi: ngày uống 1 - 2 gói, chia 2 - 3 lần.

-Trên 2 tuổi: ngày uống 2 - 3 gói, chia 2 - 3 lần.

Hòa mỗi gói thuốc với khoảng 50 ml nước, trước mỗi lần dùng thuốc cần lắc hoặc khuấy đều. Có thể thay nước bằng dịch thức ăn như nước canh, nước rau hoặc trộn kỹ với thức ăn nửa lỏng như món nghiền rau - quả.

Người lớn:

-Mỗi lần 1 gói, hòa vào nửa cốc nước ấm, khuấy đều rồi uống ngày 3 lần.

-Trường hợp tiêu chảy cấp, liều khởi đầu có thể gấp 2 lần.

Uống sau bữa ăn với người bệnh viêm thực quản.

Uống xa bữa ăn với các chỉ định khác.

Riêng viêm loét trực tràng dùng cách thụt.

Thụt trực tràng:

Mỗi lần 1 - 3 gói hòa với 50 - 100 ml nước ấm, rồi thụt. Ngày 1 - 3 lần.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Ngưng thuốc và điều trị hỗ trợ triệu chứng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ.



MEYER-BPC
CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC

Số 6A3 quốc lộ 60 p. Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre-Việt Nam

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐS. Nguyễn Văn Nôn

MẪU ĐĂNG KÝ HỘP THUỐC SMECTANEO





TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Nguyễn Văn Nền



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh