

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 27/12/2013

SOBELIN

COMPOSITION: Each capsule contains: Flunarizine HCl eqv to Flunarizine 5 mg
FOR DOSAGE, INDICATIONS, ADMINISTRATION AND PLEASE REFER MORE INFORMATION OTHER IN PACKAGE INSERT.
SPECIFICATION: In-House
STORAGE: Store in a dry place at a temperature below 30°C. Protect from light.
ROUTE OF ADMINISTRATION: Oral
FOR PRESCRIPTION USE ONLY.
KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
CAREFULLY READ THE ACCOMPANYING INSTRUCTIONS BEFORE USE.

SOBELIN

Rx Thuốc bán theo đơn

SOBELIN(Capsules)

Đường dùng: Uống

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang

SOBELIN

CÔNG THỨC: Mỗi viên nang chứa: Flunarizin HCl tương đương Flunarizin 5 mg
CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC XEM TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÈM THEO.
TIÊU CHUẨN: Nhà sản xuất
BAO QUẢN: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng ở nhiệt độ dưới 30°C.
ĐƯỜNG DÙNG: Uống
THUỐC BÁN THEO ĐƠN
GIỮ THUỐC NGOÀI TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Visa No./Số ĐK:
Batch No./ Số lô SX: XXXX
Mfg.Date/ NSX : dd/mm/yyyy
Exp.Date/ HD : dd/mm/yyyy

T.O.

Manufactured by:
T.O. CHEMICALS (1979) LTD.
280 Soi Sabaijai, Suthisarnwinjai Road,
Samsennook, Huay-Kwang, Bangkok 10320,
Thailand

Sau xuất tại Thái Lan bởi:
T.O. CHEMICALS (1979) LTD.
280 Soi Sabaijai, Suthisarnwinjai Road,
Samsennook, Huay-Kwang, Bangkok 10320,
Thailand

T.O.

Rx SOBELIN(Capsules)
Each capsule contains:
Flunarizine HCl eqv to Flunarizine.....5 mg

Rx SOBELIN(Capsules)
Each capsule contains:
Flunarizine HCl eqv to Flunarizine.....5 mg

Rx SOBELIN(Capsules)
Each capsule contains:
Flunarizine HCl eqv to Flunarizine.....5 mg

Rx SOBELIN(Capsules)
Each capsule contains:
Flunarizine HCl eqv to Flunarizine.....5 mg

Rx SOBELIN(Capsules)
Each capsule contains:
Flunarizine HCl eqv to Flunarizine.....5 mg

Rx SOBELIN(Capsules)
Each capsule contains:
Flunarizine HCl eqv to Flunarizine.....5 mg

T.O. CHEMICALS (1979) LTD. - THAILAND

B: XXXX Mfg: dd/mm/yyyy Exp: dd/mm/yyyy

M.S.D.N:0302564228-C.T.C
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM APAC
HỒ CHÍ MINH

GIẢM ĐỐC
Nguyễn Thành Hải

188/84
BS2

Rx-Thuốc bán theo đơn

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin xin tham khảo ý kiến thầy thuốc*

**Viên nang
SOBELIN**

Thành phần: Mỗi viên nang chứa

Hoạt chất: Flunarizin HCl tương đương Flunarizin 5 mg

Tá dược: Lactos, Corn starch, Talcum, Magnesium Stearat, Colloidal Silicon Dioxid, lactos supertab.

Chỉ định điều trị

Dự phòng đau nửa đầu dạng cổ điển (có tiền triệu) hoặc đau nửa đầu dạng thông thường (không có tiền triệu).

Điều trị triệu chứng chóng mặt tiền đình do rối loạn chức năng hệ thống tiền đình.

Điều trị các triệu chứng do thiếu năng tuần hoàn não và suy giảm oxy tế bào não bao gồm: chóng mặt, nhức đầu nguyên nhân mạch máu, rối loạn kích thích, mất trí nhớ, kém tập trung và rối loạn giấc ngủ.

Liều lượng và cách dùng.

Dự phòng đau nửa đầu:

Liều khởi đầu: Uống vào buổi tối.

Bệnh nhân dưới 65 tuổi: 10 mg (2 viên)/ngày.

Bệnh nhân > 65 tuổi: 5mg/ngày.

Nếu trong giai đoạn điều trị này, xảy ra các triệu chứng trầm cảm, ngoại tháp hoặc tác dụng phụ ngoài ý muốn nên ngưng điều trị. Nếu sau 2 tháng không có sự cải thiện đáng kể, bệnh nhân được xem như là không đáp ứng và nên ngừng điều trị.

Điều trị duy trì:

Nếu bệnh nhân đáp ứng tốt và nếu cần điều trị duy trì thì nên giảm liều xuống 5 ngày với liều hằng ngày như nhau và 2 ngày nghỉ mỗi tuần. Nếu điều trị duy trì phòng ngừa thành công và dung nạp tốt thì có thể ngưng điều trị trong 6 tháng và chỉ bắt đầu điều trị lại nếu tái phát.

Chóng mặt:

Liều hàng ngày tương tự như dùng cho đau nửa đầu, nhưng điều trị khởi đầu chỉ kéo dài cho đến khi kiểm soát được triệu chứng, thường là ít hơn 2 tháng. Cho dù không có sự cải thiện đáng kể sau 1 tháng đối với chóng mặt mãn tính, 2 tháng đối với chóng mặt tư thế, bệnh nhân được xem như là không đáp ứng và nên ngưng điều trị.

Chống chỉ định.

Không dùng flunarizin ở bệnh nhân có tiền sử trầm cảm hoặc đang có triệu chứng parkinson trước đó hoặc các rối loạn ngoại tháp khác.

Những lưu ý đặc biệt và cảnh báo khi sử dụng thuốc.

Điều trị này có thể gia tăng triệu chứng ngoại tháp, trầm cảm và bộc phát hội chứng parkinson, đặc biệt ở những bệnh nhân dễ có nguy cơ như người già. Do vậy nên dùng thận trọng trên các bệnh nhân này.

Trong một số trường hợp hiếm: một môi có thể gia tăng trong điều trị flunarizin, trường hợp này nên ngưng điều trị. Không vượt quá liều quy định.

Bệnh nhân phải được khám đều đặn theo kỳ hạn, đặc biệt trong giai đoạn điều trị duy trì, để có thể phát hiện sớm triệu chứng ngoại tháp hay trầm cảm và ngưng điều trị.

Nếu trong điều trị duy trì, không đạt hiệu quả điều trị thì ngưng điều trị.



Trình bày: Hộp / 10 vi x 10 viên nang.

Bảo quản: ở nơi khô ráo, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng: 3 năm kể từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc quá hạn sử dụng ghi trên bao bì

Tiêu chuẩn: Nhà sản xuất.

Cảnh báo:

- Không dùng quá liều.
- Giữ thuốc ngoài tầm tay trẻ em.

Sản xuất tại Thái Lan bởi: **T.O. Chemicals (1979) Co., Ltd.**

280 Soi Sabaijai, Suthisarnwinijai Road, Samsennok, Huay-Kwang, Bangkok 10320, Thailand

