

Để xa tầm tay trẻ em.  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.  
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

<https://trungtamthuoc.com/>

## SOFTERIN Thuốc mỡ.

SĐK: GC-0181-12

◆ **THÀNH PHẦN:** Mỗi tuýp 50g thuốc mỡ chứa

**Hoạt chất:** Urea .....10 g

**Tá dược:** Squalene, Parafin lỏng, White petrolatum, Stearyl alcohol, Acid stearic, Tocopherol acetat, Polysorbate 60, Sorbitan monostearat, Propylen glycol, Methyl parahydroxybenzoat, Propyl parahydroxybenzoat, Kali hydroxyd, Nước tinh khiết.

◆ **DẠNG BÀO CHẾ:** Thuốc mỡ.

◆ **CHỈ ĐỊNH**

Những bệnh làm sừng hóa da: chai gan bàn tay, dày sừng ở lòng bàn tay và bàn chân, bệnh vảy cá, dị ứng da, chàm dị ứng.

◆ **LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG**

Thoa thuốc lên vùng da bị bệnh, một hoặc vài lần mỗi ngày.

◆ **CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

Bệnh nhân có tiền sử bị quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Không được dùng thuốc để bôi lên mắt.

◆ **THẬN TRỌNG**

- Thận trọng khi dùng thuốc cho những bệnh nhân có cơ địa dễ bị dị ứng: viêm da dị ứng, hen suyễn hoặc quá mẫn với các loại thuốc.

- Thận trọng khi dùng thuốc cho những bệnh nhân mà những người thân trong gia đình có tiền sử dị ứng.

◆ **TƯƠNG TÁC THUỐC**

Thuốc này có thể làm tăng khả năng hấp thu và thẩm thấu qua da của những thuốc corticoid, detranol, 5-fluorouracil.

◆ **ẢNH HƯỞNG TRÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC**

Không ảnh hưởng.

◆ **PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ**

Nói chung chưa có bằng chứng về sự an toàn khi dùng urea cho phụ nữ mang thai. Đã có thông báo là nồng độ urea huyết tăng cao khi trẻ sơ sinh được điều trị bằng kem bôi da có chứa urea; vì vậy, không nên dùng tại chỗ bất kỳ thuốc nào có urea cho trẻ sơ sinh.

Không dùng thuốc trong thời gian đang cho con bú.

◆ **TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN**

Thuốc có thể gây đau rát nếu thoa thuốc lên vùng da nhạy cảm, da bị nứt nẻ hoặc đang chảy mủ.

\* Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

◆ **QUÁ LIỀU**

Thoa thuốc quá nhiều có thể gây ra kích ứng da. Nếu uống nhầm một lượng lớn urea có thể gây kích ứng tiêu hóa ( nôn và buồn nôn). Trong trường hợp quá liều, nên điều trị triệu chứng và áp dụng các liệu pháp điều trị hỗ trợ thích hợp. Trong trường hợp uống nhầm thuốc, việc uống nhiều sữa và nước có thể sẽ có ích cho bệnh nhân.

◆ **BẢO QUẢN:** Trong hộp kín, ở nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

◆ **HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

\* Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng.

◆ **QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:** Hộp 01 tuýp 50g.

Sản xuất tại

**CTY TNHH PHIL INTER PHARMA**

Số 25, Đường số 8, Khu Công nghiệp Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương.  
theo hợp đồng với **DAEWOO PHARM. CO., LTD., Hàn Quốc.**