



MAU NHÃN HỘP VIÊN NÉN STILUX - 60

207/0193

STILUX - 60
ROTUNDIN 60 mg

STILUX - 60

100 viên nén

ROTUNDIN 60 mg

Thuốc an thần - gây ngủ - giảm đau nguồn gốc thảo dược.



Traphaco™

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 27/12/2013

STILUX - 60

Thành phần: Cho 1 viên:

Rotundin (L-tetrahydropalmatin) 60 mg
Tá dược vừa đủ 1 viên

Chỉ định:

- Dùng trong các trường hợp lo âu, căng thẳng, mất ngủ.
- Sử dụng giảm đau trong các bệnh đường tiêu hoá, đau khi có kinh, đau đầu.

Tác dụng, Chống chỉ định và các thông tin khác: Xem toa hướng dẫn sử dụng.

STILUX - 60

100 Tablets

ROTUNDIN 60 mg

Tranquillizer - hypnotic - analgesic derives from herbs.



Traphaco™

STILUX - 60
ROTUNDIN 60 mg

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

SDK:
Số lô SX:
NSX:
HD:

STILUX - 60

Liều dùng - Cách dùng:

- Các trường hợp lo âu, căng thẳng, mất ngủ: uống 1 - 2 viên trước khi đi ngủ.
- Giảm đau trong các bệnh đường tiêu hoá, đau khi có kinh, đau đầu: uống 2 - 4 viên chia 2 lần mỗi ngày, có thể dùng đến 8 viên mỗi ngày.

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng.

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

75 Yên Ninh - Bà Đình - Hà Nội Tel: (84-4) 36810724 Fax: (84-4) 36811542
Tư vấn khách hàng: 18006612
Sản xuất tại: Ngõ 15, Đường Ngọc Hồi - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội

KT hộp: 42 mm x 55 mm x 105 mm

Số lô SX: HD:	Stilux - 60 ROTUNDIN 60 mg Traphaco™ TRAPHACO JOINT STOCK COMPANY	Stilux - 60 ROTUNDIN 60 mg Traphaco™ CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO	Stilux - 60 ROTUNDIN 60 mg Traphaco™ TRAPHACO JOINT STOCK COMPANY
	Stilux - 60 ROTUNDIN 60 mg Traphaco™ CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO	Stilux - 60 ROTUNDIN 60 mg Traphaco™ TRAPHACO JOINT STOCK COMPANY	Stilux - 60 ROTUNDIN 60 mg Traphaco™ CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

KT hộp: 100 mm x 41 mm. Số lô SX và HD in dập nổi trên vỉ.



Traphaco

Hồ sơ đăng ký Viên nén Stilux - 60

Địa hướng dẫn sử dụng

Viên nén Stilux – 60

Thuốc an thần - gây ngủ - giảm đau nguồn gốc thảo dược

Trình bày: Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Thành phần: Cho 1 viên

Rotundin (L- tetrahydro palmatin) 60mg

Tá dược: (lactose, tinh bột, avicel pH 101, sodium 60mg 1 viên

starch glycolat, magnesi stearat, talc, màu quinolein)

Tác dụng:

Hoạt chất của Stilux – 60 là Rotundin được chiết xuất từ củ Bình vôi (*Stephannia rotunda Lour.*), một loại thảo dược mọc hoang ở các vùng núi Việt Nam, Trung Quốc... Nó được sử dụng từ lâu trong dân gian dạng dịch chiết hỗn hợp, nay đã được nghiên cứu đầy đủ về cấu trúc hóa học, tính chất vật lý, độc tính, dược lý học và ứng dụng trên lâm sàng. Kết quả các công trình nghiên cứu của Nga, Trung quốc, Nhật Bản và Việt Nam đã chứng minh:

- Stilux – 60 có tác dụng an thần gây ngủ với liều thấp. Giấc ngủ sẽ đến sau 10 – 20 phút sau khi uống thuốc và kéo dài 4 -6 giờ hoặc có thể lâu hơn tùy liều lượng, sau khi ngủ dậy không có cảm giác mệt mỏi hay nhức đầu.
- Với liều cao hơn, thường gấp đôi liều an thần gây ngủ, Rotundin có tác dụng giảm đau rõ rệt hay được sử dụng giảm đau trong các bệnh đường tiêu hóa, đau khi có kinh, đau đầu.
- Stilux - 60 còn có tác dụng điều hòa nhịp tim, hạ huyết áp, điều hòa hô hấp, được dùng trong điều trị tăng huyết áp, chữa hen, chữa nấc.

Chỉ định

- Dùng trong các trường hợp lo âu, căng thẳng, mất ngủ.
- Sử dụng giảm đau trong các bệnh đường tiêu hoá, đau khi có kinh, đau đầu.

Liều dùng – Cách dùng:

- Các trường hợp lo âu, căng thẳng, mất ngủ: uống 1 - 2 viên trước khi đi ngủ.
- Giảm đau trong các bệnh đường tiêu hoá, đau khi có kinh, đau đầu: uống 2 - 4 viên chia 2 lần mỗi ngày, có thể dùng đến 8 viên mỗi ngày.

Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Người đang vận hành tàu xe, máy móc, người trầm cảm

Thận trọng: Có thể gây quen thuốc.



Traphaco

Hồ sơ đăng ký Viên nén Stilux - 60

Tác dụng không mong muốn: Thuốc có thể gây nên một số tác dụng phụ (hiếm khi) như: Đau đầu, chóng mặt, kích thích vật vã hoặc mất ngủ

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

Phụ nữ có thai và cho con bú:

Chưa có những nghiên cứu đầy đủ về sử dụng Rotundin đối với phụ nữ có thai và cho con bú. Do đó, phụ nữ có thai và cho con bú chỉ dùng rotundin khi cần thiết, với liều thấp và trong thời gian ngắn. Cần cân nhắc lợi ích và nguy cơ khi sử dụng thuốc.

Tương tác thuốc:

Chưa có báo cáo nào về tương tác của rotundin với thuốc khác hay các dạng tương tác khác.

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30⁰C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN THẦY THUỐC**

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội

Sản xuất tại : Hoàng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh

