

Strepsils®

Strepsils® Soothing Honey & Lemon

Thành phần

Mỗi viên ngậm chứa:

Hoạt chất: 2,4-Dichlorobenzyl Alcohol (Dybenal) 1,2 mg, Amylmetacresol 0,6 mg

Tá dược: Tinh dầu bạc hà, tinh dầu chanh không terpene, acid tartaric, sucrose, glucose lỏng, mật ong, quinoline yellow.

Strepsils® Orange with Vitamin C

Thành phần

Mỗi viên ngậm chứa:

Hoạt chất: 2,4-Dichlorobenzyl Alcohol (Dybenal) 1,2 mg, Amylmetacresol 0,6 mg, Vitamin C 100 mg

(chứa: Acid ascorbic 33,52 mg, natri ascorbate 75,0 mg).

Tá dược: Propylene glycol, hương bloodorange, menthol tự nhiên, acid tartaric, đường tinh chế, glucose lỏng, sunset yellow FC edicol, ponceau 4R edicol.

Strepsils® Original

Thành phần

Mỗi viên ngậm chứa:

Hoạt chất: 2,4-Dichlorobenzyl Alcohol (Dybenal) 1,2 mg, Amylmetacresol 0,6 mg

Tá dược: Tinh dầu anit, tinh dầu bạc hà, menthol (dưới dạng levomenthol), acid tartaric, ponceau 4R edicol, carmoisine edicol, sucrose (đường tinh chế), glucose lỏng.

Strepsils® Cool

Thành phần

Mỗi viên ngậm chứa:

Hoạt chất: 2,4-Dichlorobenzyl Alcohol (Dybenal) 1,2 mg, Amylmetacresol 0,6mg

Tá dược: Menthol (dưới dạng levomenthol), dầu khuynh diệp, acid tartaric, sucrose, glucose lỏng, đỏ carmine.

Dạng bào chế

Viên ngậm

Chỉ định

Viên ngậm Strepsils là viên ngậm kháng khuẩn để làm giảm đau họng dùng cho trẻ em và người lớn.

Liều lượng và cách dùng

Ngậm 1 viên để tan chậm trong miệng cách khoảng 2 đến 3 giờ. Không dùng quá liều đã chỉ định. Nếu các triệu chứng kéo dài, hỏi ý kiến bác sĩ.

Chống chỉ định

Quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc

Cảnh báo và thận trọng đặc biệt khi sử dụng

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Phải nhớ là trẻ nhỏ có thể bị nghẹt thở do viên ngậm.

Phụ nữ có thai và cho con bú

Không có thận trọng đặc biệt

Tác động khi lái xe và sử dụng máy móc

Không

Tương tác với các thuốc khác, các dạng tương tác khác

Chưa được biết

Tác dụng không mong muốn

Trong trường hợp hiếm, đã gặp các rối loạn như "tiêu chảy và khó chịu ở dạ dày", "viên ngậm làm đau lưỡi" v.v. mặc dù chúng không theo một dạng đặc trưng nào. Các triệu chứng của hiện tượng này đã được nhận biết khi xảy ra ở một tỷ lệ bệnh nhân dưới dạng phản ứng giả dược sau khi dùng viên lactose. (Beecher, J Am Assn 1995, 159, 1602, Wolf và Pinsky, J Am Med Assn, 1954, 155, 339).

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Quá liều

Chưa ghi nhận trường hợp quá liều nào ở người. Để có liều chết LD50 đường uống tương đương ở chuột nhất, cần dùng trên 80 viên ngậm/kg thể trọng.

Han dùng

36 tháng kể từ ngày sản xuất

Bảo quản

Bảo quản ở nhiệt độ phòng ($\leq 30^{\circ}\text{C}$)

Để thuốc xa tầm tay của trẻ em

Không dùng thuốc quá hạn sử dụng đã ghi trên bao bì

Quy cách đóng gói

Hộp 2 vỉ x 12 viên ngậm

Hộp 24 gói x 6 viên ngậm

Hộp 50 gói x 2 viên ngậm

Hộp 100 gói x 2 viên ngậm

Nhà sản xuất

Reckitt Benckiser Healthcare Manufacturing (Thailand) Ltd.

65 Moo 12, Lardkrabang-Bangplee Road,

Bangplee, Samutprakarn 10540

Thailand