

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 05/3/2013

MẪU NHÃN DÁN TRÊN CHAI

THUỐC BÁN THEO ĐƠN

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

SULFAGUANIDIN

Sulfaguanidin.....500mg
Tinh bột, eragel, magnesi stearat vđ...1 viên nén

CHỈ ĐỊNH:
Các nhiễm khuẩn đường ruột như lỵ trực khuẩn, viêm ruột, tả chảy. Phòng nhiễm khuẩn trước và sau phẫu thuật đường ruột.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:
Uống với nhiều nước, đợt điều trị thường kéo dài 5-7 ngày. Người lớn: Ngày uống 4 - 6 viên một lần, 2-3 lần/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với Sulfamid.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM

CTCP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2
9 Trần Thánh Tông - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội - Việt Nam
Sân xuất tại:
Lô 27, KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội - Việt Nam
ĐT: (04).20474126

NSX :
Số lô SX:
HD :

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KHI DÙNG

Rx

250 viên nén

SĐK:
Tiêu chuẩn : DBVN IV

GMP - WHO

2

500mg

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Q. HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI



MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

(Rx) THUỐC BÁN THEO ĐƠN

ĐỂ THUỐC XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC TRƯỚC KHI DÙNG
THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SĨ
NEU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ

VIÊN NÉN

SULFAGUANIDIN 500mg

TRÌNH BÀY: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén, chai 250 viên nén.

CÔNG THỨC:

Sulfaguanidin.....500mg
Tá dược (Tinh bột sắn, Eragel, Magnesi stearat).....vđ 1 viên

CÁC ĐẶC TÍNH TÁC DỤNG:

Các đặc tính được liệt kê:

- Sulfaguanidin là một thuốc thuộc nhóm sulfamid kháng khuẩn. Cơ chế tác dụng: là chất cạnh tranh với acid para - amino benzoic trong quá trình tổng hợp acid folic của tế bào vi khuẩn, vì vậy nó ngăn cản quá trình tổng hợp acid folic của vi khuẩn nên có tác dụng kìm khuẩn.
- Sulfaguanidin có phổ tác dụng trên cả vi khuẩn Gram âm (các vi khuẩn gây bệnh đường ruột như trực khuẩn lỵ Shigella, Proteus mirabilis...) và Gram dương (Staphylococcus...)

Các đặc tính được động học:

Sulfaguanidin khi uống không tan trong môi trường kiềm của ruột, hầu như không hấp thu qua màng ruột vào máu nên đạt nồng độ cao trong lòng ruột. Do vậy Sulfaguanidin được dùng điều trị các trường hợp nhiễm khuẩn đường ruột. Thuốc được thải trừ chủ yếu qua phân.

CHỈ ĐỊNH:

Các nhiễm khuẩn đường ruột như lỵ trực khuẩn, viêm đại tràng, viêm ruột, tiêu chảy, viêm dạ dày ruột.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: Uống với nhiều nước, đợt điều trị thường kéo dài 5-7 ngày.

- Người lớn: ngày uống 4-6 viên một lần, 2-3 lần một ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Mẫn cảm với sulfamid.

TƯƠNG TÁC THUỐC KHÁC:

- Tránh phối hợp với các dẫn chất Opi.
- Thận trọng khi sử dụng Methotrexat.

NHỮNG LƯU Ý ĐẶC BIỆT VÀ CẢNH BÁO KHI DÙNG THUỐC:

- Tùy theo cơ địa, vẫn có thể có 15 - 20% liều uống Sulfaguanidin được hấp thu qua màng ruột vào máu gây ra dị ứng ngoài nặng (hội chứng Lyell), thậm chí cả phản ứng phụ mất bạch cầu hạt (có khả năng tử vong), có khả năng kết tủa ở thận dẫn đến suy thận.

- Không dùng thuốc kéo dài vì gây ảnh hưởng hệ vi khuẩn đường ruột.

- Thận trọng ở bệnh nhân suy gan, thận.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Tiêu hóa: buồn nôn, nôn, tiêu chảy, viêm miệng, viêm lưỡi.

Thận: viêm thận kẽ, suy thận, sỏi thận.

Dạ: ban da, mụn phỏng, mày đay, hội chứng Stevens-Johnson và Lyell.

Máu: thiếu máu hồng cầu to do thiếu acid folic, thiếu máu tan máu, giảm huyết tố hồng cầu.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Thận trọng khi sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE HOẶC VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Chưa được ghi nhận.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Không dùng quá thời hạn ghi trên bao bì.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: ĐVN IV



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2 - DOPHARMA

9 Trần Thánh Tông - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội - Việt Nam

Sản xuất tại:

Lô 27, KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội - Việt Nam

ĐT: (04).20474126

Hà nội, ngày 10 tháng 6 năm 2011

Giám Đốc *Tung*



PHÓ GIÁM ĐỐC

S. Nguyễn Thị Thùy Hòa

ĐƯỢC



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thanh