

Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2016

DR. Ho Quynh Son

PHÒNG TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TÂM THUỐC

ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG

PHÂN XƯỞNG



Superkan - S


Composition: Each capsule contains
Ginkgo biloba extract..... 80mg
Excipientsq.s.f. 1 capsule

Indications, contra-indication, dosage, administration and other information:
See the leaflet enclosed.

Storage: Stored in a dry place, protected from light, below 30°C.

Specifications: Manufacturer's
SDK/Reg.No:
Keep out of reach of children.
Read carefully the leaflet before use.

Số lô SX/ Lot.No:
Ngày SX/ Mfd:
Hạn dùng/ Exp:



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC SUPERKAN-S

Thành phần: mỗi viên nang có chứa:

- Cao khô lá Bạch quả (*Extractum Folii Ginkgo biloba Siccus*).... 80mg (tương đương với 19,2mg flavonoid toàn phần)

- *Tá dược:* Tinh bột sắn, Tricalci phosphat, Magnesi carbonat, Talc, Magnesi stearat vừa đủ 1 viên.

Được lực học: Theo kết quả nghiên cứu trên in vitro và in vivo thì cao Bạch quả có các tác dụng sau:

- Cao bạch quả có tác dụng điều hòa vận mạch trên toàn bộ mạch máu: động mạch, mao mạch, tĩnh mạch. Tác dụng phụ thuộc vào liều lượng và thay đổi tùy theo tính chất, đường kính và nguồn gốc của mô mạch máu. Ngoài ra còn phụ thuộc vào trạng lực cơ bản và tình trạng của thành mạch, kích thích sự tiết EDRF từ nội mô (Endothelium derived relaxing factor).

- Cao Bạch quả chống phù mạch ở não lẫn ngoại biên, che chở hàng rào máu - não, máu - võng mạc.

- Cao Bạch quả ức chế yếu tố hoạt hóa tiểu cầu, ngăn chặn hiện tượng kết tập tiểu cầu, phòng sự tạo thành huyết khối và tai biến mạch máu não.

- Cao Bạch quả có tác dụng bảo vệ các neuron ở não và các tế bào thần kinh cảm giác.

- Cải thiện tuần hoàn máu: thuốc có tác dụng làm giảm độ nhớt máu và làm tăng độ đàn hồi của hồng cầu và bạch cầu, do đó làm tăng tuần hoàn máu.

Được động học:

- Cao bạch quả hấp thu hoàn toàn qua đường uống. Thuốc chủ yếu được hấp thu ở phần trên của đường tiêu hóa. Nồng độ đỉnh đạt được sau 1h30 phút.

- Thuốc được phân bố chủ yếu ở mắt, các loại mô hạch và thần kinh, đặc biệt là vùng dưới đồi, hồi hải mã và thể vân.

- Thuốc thải trừ qua đường niệu, thời gian bán hủy khoảng 4h30 phút.

Chỉ định:

- Điều trị mất trí nhớ ngắn hạn, thiếu nhạy bén và minh mẫn tâm thần, kém tập trung, trầm cảm.

- Điều trị trạng thái lão suy (kể cả bệnh Alzheimer)

- Điều trị hội chứng khập khiễng cách hồi, bệnh võng mạc (thoái hóa điểm vàng, bệnh võng mạc do đái tháo đường),

các hội chứng thuốc thiếu năng tai trong (nhức đầu, chóng mặt, ù tai, lảng tai) ở người cao tuổi.

- Hỗ trợ điều trị các di chứng sau đột quỵ, chấn thương sọ não.

Liều lượng và cách dùng:

- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: 1 viên/lần, 2-3 lần/ngày

- Uống sau bữa ăn, mỗi đợt dùng 4 - 6 tuần. Có thể dùng thuốc trong thời gian dài.

Chống chỉ định:

- Không sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai, người đang có xuất huyết, rối loạn đông máu. Không dùng đồng thời với thuốc chỉ huyết.

Thận trọng:

- Thuốc này không phải là thuốc hạ huyết áp, không thể dùng để điều trị thay thế cho các thuốc chống cao huyết áp đặc trị.

- Thận trọng khi sử dụng thuốc trên bệnh nhân đang sử dụng thuốc chống đông máu, chống kết tập tiểu cầu, trẻ em dưới 12 tuổi.

Tác dụng không mong muốn:

- Rất hiếm gặp: Rối loạn tiêu hóa, nhức đầu, dị ứng da.

- Có thể kéo dài thời gian chảy máu.

Thông báo cho thầy thuốc tác dụng không mong muốn gặp phải trong khi sử dụng thuốc

Thời kỳ có thai và đang cho con bú:

- Chưa có các nghiên cứu đầy đủ, không nên dùng thuốc khi đang có thai hoặc đang cho con bú nếu không có hướng dẫn của thầy thuốc.

Người lái xe và vận hành máy móc: Được dùng.

Tương tác thuốc: Dùng đồng thời với các thuốc chống đông máu, thuốc chống kết tập tiểu cầu có thể làm tăng nguy cơ rối loạn chảy máu.

Quá liều và xử trí: Chưa có báo cáo về sử dụng quá liều.

Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay của trẻ em
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc*

CTCP DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Trụ sở: 358 Giải Phóng- Phường Liệt - Thanh Xuân- Hà Nội

ĐT: 04-38646111 Fax: 04-38646802

SX tại: 356 Giải Phóng- Phường Liệt - Thanh Xuân- Hà Nội



*TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Đỗ Minh Hùng*

*PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐS. Hà Xuân Sơn*