

TN-36070

143/16 BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 01 / 08 / 2019

TAM THẤT VINAPLANT



Hộp 2 vỉ x 10 viên nang cứng

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG

Ngày uống 3 lần, mỗi lần 2-5 viên, uống sau bữa ăn.
CHỖNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.
TIÊU CHUẨN: TCCS

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG - ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

TAM THẤT VINAPLANT



Hộp 2 vỉ x 10 viên nang cứng

THÀNH PHẦN (Cho 1 viên)

Bột Tam thất (Rễ củ) 500mg
Ta được vừa đủ 1 viên

CHỈ ĐỊNH:

- Bột bổ cơ thể, bổ máu, phục hồi sức khỏe phụ nữ sau khi sinh.
- Chưa rụng chảy máu do ứ huyết: Hô ra máu, nôn ra máu, chảy máu cam, kiết lỵ ra máu, rong kinh.
- Chưa rụng đau do chấn thương, thiếu máu, người mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt.

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
Địa chỉ: Lô CN-1, Khu công nghiệp Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
ĐT: 024. 33545949



SPK:
Lô SX:
NSX:
HD:

TAM THẤT VINAPLANT



Hộp 5 vỉ 10 viên nang cứng

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG - ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG

Ngày uống 3 lần, mỗi lần 2-5 viên, uống sau bữa ăn.
CHỖNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.
TIÊU CHUẨN: TCCS

TAM THẤT VINAPLANT



Hộp 5 vỉ 10 viên nang cứng

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG - ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
Địa chỉ: Lô CN-1, Khu công nghiệp Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
ĐT: 024. 33545949



THÀNH PHẦN: (Cho 1 viên)

Bột Tam thất (Rễ củ)500mg
Tá được vừa đủ 1 viên

CHỈ ĐỊNH:

- Bồi bổ cơ thể, bổ máu, phục hồi sức khỏe phụ nữ sau khi sinh.
- Chữa chứng chảy máu do ứ huyết: Ho ra máu, nôn ra máu, chảy máu cam, kiết lỵ ra máu, rong kinh.
- Chữa sưng đau do chấn thương, thiếu máu, người mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt.

Hộp 10 viên nang cứng

**TAM THẮT
VINAPLANT**



ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG - ĐỂ XÀ TẮM TAY TRẺ EM

SDK:
Lô SX:
NSX:
HD:

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG

Ngày uống 3 lần, mỗi lần 2-5 viên, uống sau bữa ăn.
CHỖNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C
TIÊU CHUẨN: TCCS

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng

**TAM THẮT
VINAPLANT**



Cơ sở sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT

Địa chỉ: Lô CN-1, Khu công nghiệp Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
ĐT: 024. 33545949

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG - ĐỂ XÀ TẮM TAY TRẺ EM



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

TAM THẤT VINAPLANT

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng - Để xa tầm tay trẻ em.



Thành phần: (cho 1 viên)

Thành phần dược chất:

Bột Tam thất (*Pulvis Panaxis notoginseng*)500mg

Thành phần tá dược:

Tá dược (Avicel 101, talc, Aerosil).....vừa đủ 1 viên.

Dạng bào chế: Viên nang cứng, màu xanh.

Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên, hộp 5 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên.

Chỉ định:

- Bồi bổ cơ thể, bổ máu, phục hồi sức khỏe phụ nữ sau khi sinh.
- Chữa chứng chảy máu do ứ huyết: Ho ra máu, nôn ra máu, chảy máu cam, kiết lỵ ra máu, rong kinh.
- Chữa sưng đau do chấn thương, thiếu máu, người mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt.

Cách dùng & liều dùng: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 - 5 viên, uống sau bữa ăn.

Tác dụng không mong muốn của thuốc: Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc. Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

Chống chỉ định: Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai.

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: Thuốc uống, không nên dùng dài ngày.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Thuốc chống chỉ định cho phụ nữ có thai.
- Phụ nữ cho con bú: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ cho con bú, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: Hiện vẫn chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

Tương tác, tương kỵ của thuốc:

- Tương tác của thuốc: Chưa có tài liệu, báo cáo nào của thuốc được ghi nhận.
- Tương kỵ của thuốc: Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

Quá liều và cách xử trí: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc. Trường hợp dùng thuốc quá liều, cần tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Cơ sở sản xuất:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát

Địa chỉ: Lô CN-1, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 33545949.



TS. CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Ngọc Anh